




SEMENCES PRIDE

# FONDÉ SUR PRIDE



GUIDE DE SEMENCE



LA GAMME 2027



# Fondé sur PRIDE

Ce qui a commencé par une idée est devenu bien plus, grâce aux champs, aux fermes et aux relations que nous avons développées au fil des ans.

**Depuis nos racines canadiennes,** nous avons développé de solides relations avec les agriculteurs et les agents qui travaillent avec nous année après année. Chaque produit reflète l'expérience acquise au champ, l'expertise locale et la collaboration avec ceux qui connaissent le mieux le terrain.

**Être Canadiens, c'est bien plus que l'endroit où nous sommes établis. C'est notre façon de travailler. Cela signifie comprendre les environnements auxquels vous faites face, les défis que vous relevez et les attentes que vous avez envers nous.**

**Nos agents sont de véritables partenaires.** Ils donnent vie à Semences PRIDE dans leurs communautés grâce à leur expertise, à leur service et à leur soutien, bien au-delà du sac de semences.

**Nos agriculteurs sont au cœur de tout ce que nous faisons.** Leur expérience et leurs commentaires orientent les décisions que nous prenons, du développement des produits au soutien que nous offrons chaque saison. Ces relations nous permettent de demeurer profondément liés aux communautés que nous sommes fiers de servir.





# Fondé sur une force mondiale. Éprouvé ici.

Depuis plus de 75 ans, Semences PRIDE est fièrement enracinée dans l'agriculture canadienne.

Dès le premier jour, notre mission a toujours été claire: offrir aux agriculteurs des produits de semences performants et une expertise agronomique qui les aident à réussir, saison après saison. Cet engagement a façonné notre identité, notre façon de travailler et l'innovation que nous intégrons à chacune de nos semences.

Aujourd'hui, Semences PRIDE est reconnue partout au Canada pour offrir des génétiques de maïs et de soya de premier plan, appuyées par une équipe de spécialistes de ces produits.

Nous travaillons en collaboration avec les agriculteurs afin de comprendre leurs défis et de nous assurer que chaque hybride et chaque variété sont sélectionnés, évalués et positionnés pour offrir leur meilleur rendement là où cela compte le plus: dans les champs canadiens, sous les conditions canadiennes.

Des décennies d'expertise locale nous permettent de développer des génétiques qui repoussent les limites du potentiel de rendement afin de faire progresser la performance agronomique.



Notre force est également amplifiée par GDM, un chef de file mondial en génétique du maïs et du soya, dont le germoplasme est utilisé sur environ 45 % des superficies en soya à l'échelle mondiale. Grâce au réseau mondial de sélectionneurs, d'agronomes et à la recherche avancée axée sur les données de GDM, nous mettons une innovation de calibre mondial directement au service des agriculteurs canadiens.

Nous sommes fiers de notre nom, fiers de nos racines, de nos partenariats et des agriculteurs qui nous font confiance pour contribuer à bâtir leur avenir. **Nous sommes Semences PRIDE, et nous sommes là pour vous aider à réussir.**





# Solutions avancées de protection

La gamme de produits Semences PRIDE s'appuie sur un programme mondial de sélection et est mise à l'essai localement afin d'offrir une performance dans les régions où vous cultivez chaque jour.

Nos hybrides combinent des technologies de caractères avancées et des options de traitements de semences conçues pour protéger votre rentabilité—des dommages causés aux racines en début de saison jusqu'aux dommages aux épis en fin de saison, en passant par les ravageurs qui compromettent la solidité des tiges et l'efficacité de la récolte. Le résultat: une meilleure tenue, un grain propre et de grande qualité, ainsi qu'une performance fiable tout au long de la saison.

Grâce à des technologies de caractères supérieures conçues pour répondre aux défis locaux, Semences PRIDE vous offre une protection et une performance sur lesquelles vous pouvez compter.

## PRIDE SÉRIE

|                                                    |                                                                                                                                                                             | <br>VTDoublePRO <sup>®</sup><br><small>REFUGE INTÉGRAL</small> | <br>Trecepta <sup>®</sup><br><small>REFUGE INTÉGRAL MAÏS</small> | <br>VT4PRO <sup>®</sup><br><small>REFUGE INTÉGRAL</small> | <br>SmartStax <sup>®</sup><br><small>REFUGE INTÉGRAL</small> | <br>SmartStax <sup>®</sup> PRO<br><small>REFUGE INTÉGRAL</small> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REFUGE                                             |                                                                                                                                                                             | 5% Refuge Intégral <sup>®</sup>                                                                                                                   | 5% Refuge Intégral <sup>®</sup>                                                                                                                     | 5% Refuge Intégral <sup>®</sup>                                                                                                              | 5% Refuge Intégral <sup>®</sup>                                                                                                                 | 5% Refuge Intégral <sup>®</sup>                                                                                                                     |
| TOLÉRANCE AUX HERBICIDES                           | Tolérance aux herbicides                                                                                                                                                    | Roundup Ready <sup>®</sup> 2 Technologie                                                                                                          | Roundup Ready <sup>®</sup> 2 Technologie                                                                                                            | Roundup Ready <sup>®</sup> 2 Technologie                                                                                                     | Roundup Ready <sup>®</sup> 2 Technologie Glufosinate*                                                                                           | Roundup Ready <sup>®</sup> 2 Technologie Glufosinate*                                                                                               |
| SUPPRESSION DES INSECTES HORS SOL OU RÉPRESSION    | <br>Ver de l'épi du maïs<br><i>Helicoverpa zea</i>                                       | ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                        | ● ●                                                                                                                                             | ● ●                                                                                                                                                 |
|                                                    | <br>Ver-gris occidental des haricots<br><i>Richia albicosta</i>                          | -                                                                                                                                                 | ●                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                            | -                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                   |
|                                                    | <br>Pyrale du maïs<br><i>Ostrinia nubilalis</i>                                          | ● ●                                                                                                                                               | ● ●                                                                                                                                                 | ● ●                                                                                                                                          | ● ● ●                                                                                                                                           | ● ● ●                                                                                                                                               |
|                                                    | <br>Pyrale du sud-ouest<br><i>Diatraea grandiosella</i>                                | ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                        | ● ● ●                                                                                                                                           | ● ● ●                                                                                                                                               |
|                                                    | <br>Légionnaire d'automne<br><i>Spodoptera frugiperda</i>                              | ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                        | ● ● ●                                                                                                                                           | ● ● ●                                                                                                                                               |
|                                                    | <br>Ver-gris noir<br><i>Agrotis ipsilon</i>                                            | -                                                                                                                                                 | ●                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                            | ●                                                                                                                                               | ●                                                                                                                                                   |
| SUPPRESSION DES INSECTES SOUTERRAINS OU RÉPRESSION | <br>Chrysomèle des racines du maïs du nord<br><i>Diabrotica barberi</i>                | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                   | ● ●                                                                                                                                          | ● ●                                                                                                                                             | ● ● ●                                                                                                                                               |
|                                                    | <br>Chrysomèle des racines du maïs de l'ouest<br><i>Diabrotica virgifera virgifera</i> | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                   | ● ●                                                                                                                                          | ● ●                                                                                                                                             | ● ● ●                                                                                                                                               |

Mode d'action = suppression ou répression du ravageur   ● Mode d'action simple   ● ● Mode d'action double   ● ● ● Mode d'action double

\*Veuillez lire l'étiquette de la semence pour confirmer la tolérance à l'herbicide du composant refuge avant d'utiliser le glufosinate ou le glyphosate. DuPont Pioneer revendique la suppression du ver de l'épi du maïs sur les étiquettes Optimum<sup>®</sup> AcreMax<sup>®</sup> 1, Optimum<sup>®</sup> AcreMax<sup>®</sup> et Optimum<sup>®</sup> AcreMax<sup>®</sup> Xtreme avec la technologie Herculex<sup>®</sup> I. Cry0A.105 et Cry2Ab2 de B.t. suppriment ou répriment le ver de l'épi du maïs. Syngenta revendique la répression du ver de l'épi du maïs avec le Bt11. Les performances peuvent varier d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre, car les conditions locales de culture, de sol et météorologiques peuvent varier. Les producteurs devraient évaluer les données provenant de plusieurs endroits et sur plusieurs années chaque fois que cela est possible. Ils devraient tenir compte des impacts de ces conditions sur leurs champs. DuracadeViptera<sup>™</sup>, Viptera<sup>™</sup> Z3, Viptera<sup>™</sup> et Agrisure Viptera<sup>®</sup> 3110A contiennent la technologie Agrisure Artesian<sup>®</sup>.



# Hybrides maïs grain

Les hybrides de maïs grain Semences PRIDE sont développés spécialement pour les champs canadiens. Misant sur une levée vigoureuse, une bonne tolérance au stress et un rendement constant, nos hybrides ont fait leurs preuves dans divers environnements et types de sols. De la floraison précoce à une excellente santé des plants et une bonne tenue, chaque hybride est conçu pour l'agriculteur canadien, offrant rendement, fiabilité et confiance, du semis à la récolte.

## Table des matières

Découvrez les marques Semences PRIDE<sup>®</sup> présentées dans cette section. Les détails complets des hybrides se trouvent aux pages suivantes.

|    |                              |    |                              |
|----|------------------------------|----|------------------------------|
| 14 | A3979G2 RIB                  | 22 | A6566G8 RIB                  |
| 14 | A4226G2 RIB <i>*NOUVEAU*</i> | 22 | A6580G4 RIB                  |
| 15 | A4494G2 RIB                  | 23 | A6757G8 RIB                  |
| 15 | A4646G2 RIB                  | 23 | A6846G6 RIB <i>*NOUVEAU*</i> |
| 16 | A4848G2 RIB                  | 24 | A6975G2 RIB                  |
| 16 | A5175G2 RIB <i>*NOUVEAU*</i> | 24 | A7197G8 RIB                  |
| 17 | A5292G8 RIB                  | 25 | A7199G9 RIB                  |
| 17 | A5424G2 RIB                  | 25 | A7181 C                      |
| 18 | A5580G4 RIB <i>*NOUVEAU*</i> | 26 | A7275G2 RIB                  |
| 18 | A5775G2 RIB                  | 26 | A7388G8 RIB                  |
| 19 | A5959G2 RIB                  | 27 | A7474G6 RIB <i>*NOUVEAU*</i> |
| 19 | A5977G8 RIB                  | 27 | A7780G4 RIB <i>*NOUVEAU*</i> |
| 20 | A6226G2 RIB <i>*NOUVEAU*</i> | 28 | A8303G8 RIB                  |
| 20 | A6015 C                      |    |                              |
| 21 | A6018G2 RIB                  |    |                              |
| 21 | A6499G9 RIB <i>*NOUVEAU*</i> |    |                              |

\*Tous les codes de produits Semences PRIDE mentionnés sont des noms de marque exclusifs pour des hybrides uniques enregistrés au Canada.

### Emportez le guide au champ.

Scannez le code QR pour consulter les plus récents résultats d'essais en maïs grain et les données de performance au champ.





# Protection des semences de maïs

Notre programme de recherche et de développement est solidement enraciné dans les besoins de nos agriculteurs et les conditions de culture uniques qu'ils rencontrent. Chaque année, notre équipe accorde une attention particulière aux ravageurs et aux maladies présents dans les champs, tout comme aux menaces émergentes à l'horizon. Ces observations alimentent notre engagement à développer des solutions hybrides novatrices conçues pour offrir du succès, saison après saison, afin que les agriculteurs puissent semer en toute confiance.


Les traitements de semences offrent à vos cultures la chance d'exprimer pleinement leur potentiel génétique au champ. Grâce à une levée rapide et à une protection en début de saison, vous profitez d'avantages clés: racines solides, résistance aux maladies, lutte contre les insectes et un positionnement optimal pour un rendement maximal.

Le traitement fongicide Vayantis® contient le composé le plus puissant pour protéger les plantules de maïs contre le Pythium, vous offrant une sécurité accrue, sachant que la génétique de votre maïs est protégée.

Le Pythium représente une menace majeure pour les producteurs de maïs, causant plus de dégâts que les maladies des plantules comme le Fusarium et le Rhizoctonia réunis.

Pour en savoir plus sur les technologies appliquées à la semence, visitez: [semencespride.com](https://semencespride.com)

Une défense intégrée pour un départ en force.



Protéger ce qui compte le plus, dès la semence.





# Légende du maïs

## Caractéristiques agronomiques

### Maturité relative (MR)

En fonction de la maturité physiologique et de l'humidité de la récolte.

### Ensilage éprouvé

Évaluation basée sur la digestibilité et l'énergie nette par acre. Nos produits d'ensilage éprouvés sont soumis à des tests rigoureux et mesurés par rapport aux normes de l'industrie pour déterminer leur valeur par rapport aux hybrides de maïs ensilage existants.

### Vigueur à la levée

Levée et croissance précoces. Les bandes pointillées les plus longues sont les plus rapides.

### Dessication

Les bandes pointillées les plus longues indiquent un séchage plus rapide. À utiliser pour comparer des produits de maturité similaire.

### Rétention de la verdeur

Capacité du plant à maintenir la photosynthèse dans les feuilles et les tiges plus longtemps au cours de la saison.

### Tolérance à la sécheresse

Des bandes pointillées les plus longues indiquent une tolérance au stress thermique et à des conditions plus sèches. Il ne s'agit pas d'une valeur absolue, car des conditions extrêmes affecteront probablement la performance.

### Poids spécifique

Des bandes pointillées plus longs indiquent des poids spécifiques plus élevés.

### Apparence à la récolte

Des bandes pointillées plus longues indiquent une meilleure intégrité du plant plus tard dans la saison.

### DJC

Le nombre d'unités thermiques (degrés-jours de croissance) requis par un plant de maïs depuis le moment où il est semé jusqu'au stade soies, pollen et le point noir.

## Gestion des cultures

### Population recommandée

Population finale souhaitée. Il convient de l'adapter aux besoins spécifiques selon la gestion et l'environnement.

### Maïs en continu

Tient compte de l'évaluation de la santé générale d'un produit due à l'augmentation de la pression des maladies avec maïs en continu.

### Adaptation au semis direct

Cette cote est étroitement liée à la levée et à la croissance précoce, car les sols de semis direct sont souvent plus froids et plus humides.

## Santé des plants

### Réponse aux fongicides

Bonne, très bonne ou excellente indique, la réaction aux applications de fongicides sous environnements pathologiques défavorables.



### Tolérance à la maladie

Dans les environnements pathologiques défavorables, la bande pointillée la plus longue indique une tolérance élevée. La plus courte indique une piètre tolérance.

### Tache goudronneuse

La tache goudronneuse est un champignon qui nuit au rendement. Elle se manifeste par de petites taches noires circulaires, surélevées sur les feuilles. Les bandes pointillées plus longues indiquent une tolérance et les plus courtes, une susceptibilité modérée.

### Flétrissure de Goss

La flétrissure de Goss est une maladie bactérienne du maïs. Elle est causée par une bactérie Gram positif, *Clavibacter michiganensis* subsp. *nebraskensis* (CMN). Cette maladie peut provoquer des symptômes foliaires et un flétrissement systémique du maïs.



## Caractéristiques du plant

### Floraison pour la maturité

La floraison a lieu plus tôt, en même temps (milieu de la saison) ou plus tard par rapport à des produits de maturité similaire.

**Floraison:** Hâtif (H), Normal (N) and Tardif (T).

### Hauteur du plant

Moyennement court, moyen, moyennement grand ou grand.

### Type d'épi

Flex (F), Semi-flex (SF), Semi-déterminé (SD), Déterminé (D).


**Flexibilité de l'épi:** Rangs (R), Longueur (L), Profondeur (P).

### Hauteur de l'épi

Basse, moyennement basse, moyenne, moyennement élevée ou élevée.

### Diagramme des caractéristiques des plants

L'exemple ci-dessous illustre les caractéristiques principales des plants utilisées pour décrire chaque produit dans le guide.



**Unités thermiques de croissance (UTC)**

**Floraison:** N • **Point noir:** 2595

## Évaluation des produits

Semences PRIDE assigne des cotes d'évaluation aux caractéristiques du produit sur la base de comparaisons avec d'autres produits de Semences PRIDE et non avec des produits concurrents, par le biais de tests internes sur le terrain. Les performances peuvent varier d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre, attribuables à des conditions variables de croissance, du sol et de la météo. Les producteurs devraient évaluer des données provenant de plusieurs lieux et années chaque fois que cela est possible. Ils devraient prendre en compte l'impact de ces conditions sur leurs champs.

### Évaluation à partir des bandes pointillées

Les bandes pointillées visibles indiquent les cotes. Elles remplacent les valeurs numériques utilisées dans les précédents guides de semences.



— Indique qu'aucune valeur n'est disponible ou qu'elle n'est pas applicable

## Versions des caractères

Présentement, dans le maïs, ces versions de caractères à valeur ajoutée sont proposées:



## CONVENTIONNEL



A3979

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2025 UTM

Hybride à grain hâtif, très fort potentiel pour les zones de maturité à saison courte. Excellente levée et vigueur des plantules pour un démarrage rapide en début de saison. Très belle circonférence et constance de l'épi. Floraison appropriée pour la zone et dessiccation rapide pour la maturité. A démontré un potentiel de rendement élevé pour la cote de maturité.

- ✓

Floraison et finition précoces, un bon rendement, une flexibilité de semis et moins de risques en fin de saison
- ✓


Dessiccation rapide permettant une récolte hâtive
- ✓

Bonne tolérance aux maladies foliaires pour des plants sains et un rendement stable, même sous pression

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 70 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Faibles populations       | ●●●●●●●● |
| Populations moy.          | ●●●●●●●● |
| Populations élevées       | ●●●●●●●● |
| Sol marginal              | ●●●●●●●● |
| Un sol productif          | ●●●●●●●● |
| Mais en continu           | ●●●●●●●● |
| S'adapte au semis direct  | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2150

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

A4226

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2125 UTM

Offre une excellente tenue et une solide performance en début de saison. Grâce à sa levée hâtive, sa floraison précoce et sa bonne vigueur, cet hybride est bien adapté aux régions à saison de croissance courte. Il s'établit bien, même dans des conditions difficiles, avec un dessèchement rapide, un poids spécifique amélioré ainsi qu'une excellente solidité des tiges et des racines.

- ✓

Floraison hâtive et dessèchement rapide favorisant une récolte en temps opportun
- ✓


Excellente levée au printemps et vigueur en début de saison
- ✓

Établissement solide et uniforme, même dans des conditions difficiles

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 72 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Faibles populations       | ●●●●●●●● |
| Populations moy.          | ●●●●●●●● |
| Populations élevées       | ●●●●●●●● |
| Sol marginal              | ●●●●●●●● |
| Un sol productif          | ●●●●●●●● |
| Mais en continu           | ●●●●●●●● |
| S'adapte au semis direct  | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | —        |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Flowering: H • Black Layer: 2342

Taux de semis 32-34 000 plants par acre

A4494

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2250 UTM

Il offre un caractère de protection contre les insectes aériens. Il combine potentiel de rendement élevé et stabilité sur tous les types de sols. Résiste très bien à la sécheresse. Épis de longueur intermédiaire, trapus, porteurs d'un grain propre de qualité. Polyvalent, avec un ensemble agronomique solide, il est résistant et donne de bons rendements.

- ✓

Intégrité impressionnante des plants tout au long de la saison. Cela permet une grande flexibilité sur le calendrier des récoltes
- ✓


Fort et vigoureux à la levée au printemps
- ✓

S'établit bien sous conditions difficiles

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 76 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Faibles populations       | ●●●●●●●● |
| Populations moy.          | ●●●●●●●● |
| Populations élevées       | ●●●●●●●● |
| Sol marginal              | ●●●●●●●● |
| Un sol productif          | ●●●●●●●● |
| Mais en continu           | ●●●●●●●● |
| S'adapte au semis direct  | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: H • Point noir: 2230

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

A4646

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2300 UTM

Hybride double usage conçu pour une performance élevée en grain et en ensilage. Bonne vigueur en début de saison, excellent potentiel de rendement et séchage rapide. Agronomiquement solide, avec une bonne rétention de la verdeur et une plante en santé. Fiable en semis hâtif, il performe aussi bien au nord de sa zone principale de maturité. Sa flexibilité d'épi en environnements moyens et sa stature équilibrée en font un choix polyvalent et sûr pour vos acres.

- ✓

Convient bien au nord de la zone primaire d'adaptation
- ✓


Très bonne vigueur des plantules, en fait un bon choix pour un semis hâtif
- ✓

Bonne flexibilité sous conditions de rendement modéré

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 79 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Faibles populations       | ●●●●●●●● |
| Populations moy.          | ●●●●●●●● |
| Populations élevées       | ●●●●●●●● |
| Sol marginal              | ●●●●●●●● |
| Un sol productif          | ●●●●●●●● |
| Mais en continu           | ●●●●●●●● |
| S'adapte au semis direct  | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison N • Point noir 2235

Taux de semis 32-36 000 plants par acre











A6226

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

NOUVEAU!

2800 UTM

Offre un excellent potentiel de rendement pour son groupe de maturité, avec une très bonne tolérance à la sécheresse. S'adapte bien à divers environnements de rendement et types de sols, avec une bonne réponse à des populations moyennes qui optimisent la flexibilité de l'épi. Soutenu par des tiges et racines solides ainsi qu'une bonne réponse au fongicide, cet hybride offre une performance fiable et une bonne résilience tout au long de la saison.

- ✔

Performance constante dans divers environnements et types de sols, avec une forte adaptabilité aux défis agronomiques
- ✔


Les populations moyennes optimisent la flexibilité de l'épi pour un bon équilibre entre rendement et santé des plants
- ✔

Excellente réponse aux applications de fongicide, améliorant la gestion des maladies et le potentiel de rendement

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 92 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2552  
Taux de semis 33-35 000 plants par acre

A6015

CONVENTIONNEL

2800 UTM

Hybride de référence offrant d'excellentes performances en grain et en ensilage, avec une qualité et une constance remarquables. Levée rapide, vigueur printanière élevée et séchage efficace. Visuellement attrayant, avec des tiges et des racines durables et une excellente qualité de grain. Bonne santé foliaire et tolérance aux maladies soutenant un rendement constant. Flexibilité d'épi démontrée avec des rangs supplémentaires et un solide profil agronomique pour une bonne tenue en fin de saison.

- ✔

Épi flexible capable d'ajouter des rangs de grains supplémentaires
- ✔


Excellent ensemble agronomique
- ✔

Excellente santé en fin de saison et intégrité du plant

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 92 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2375  
Taux de semis 30-36 000 plants par acre

A6018

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2800 UTM

Produit d'une famille éprouvée pour un rendement et des performances d'ensilage exceptionnels, année après année. Potentiel de rendement supérieur et constant dans sa maturité. Rapide (levée, vigueur printanière, dessiccation du grain). Performance exceptionnelle au printemps, capacité de gérer une large gamme de conditions de croissance et d'environnements. Hybride visuellement attrayant, excellent en qualité de grain et constance.

- ✔

Excellent ensemble agronomique en semis direct et en systèmes de travail réduit du sol
- ✔


Peut facilement être positionné pour des conditions de semis hâtif
- ✔

Excellent pour double usage (grain et ensilage)

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 92 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2380  
Taux de semis 30-36 000 plants par acre

A6499

G9

RIB

SmartStaxPRO

Avec ARNi TECHNOLOGIE

NOUVEAU!

2850 UTM

Offre une excellente tenue et une performance constante du début de la saison jusqu'au dessèchement. Ses caractéristiques à double usage procurent une grande polyvalence pour la production de grain ou de fourrage, tandis que son ensemble de tolérances aux maladies favorise la santé du plant et la stabilité des rendements. Excellent choix sur des retours en maïs et protection maximale contre les insectes.

- ✔

Caractéristiques à double usage pour le grain et le fourrage
- ✔


Ensemble complet contre les insectes aériens et souterrains
- ✔

Excellente tenue du début de la saison jusqu'au dessèchement

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 94 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2849  
Taux de semis 34-36 000 plants par acre



A6566

GB

RIB

SmartStax<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL™

2850 UTM

Un hybride SmartStax® destiné aux zones de 2850 unités thermiques offrant une protection par caractère contre les insectes aériens et souterrains. Il combine potentiel de rendement élevé et stabilité sur tous les types de sols. Épi long et belle circonférence.

- ✓

Excellent choix pour la culture maïs sur maïs
- ✓

Solide ensemble agronomique
- ✓

Excellente tolérance à la pourriture de la tige par l'anthracnose

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 95 jours                 |
| Levée                     | ●●●●●●●●●●               |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●●●               |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●               |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●               |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●●●               |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●               |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Maïs en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |            |                           |            |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1230 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2390

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

NOTES

A6580

G4

RIB

Trecepta<sup>™</sup>

REFUGE INTÉGRAL™

2875 UTM

Il offre un caractère de protection contre les insectes aériens incluant le ver-gris occidental des haricots (VGOH). Rendement élevé et constant sous de nombreux environnements. Excellente qualité de grain avec taille et circonférence d'épi constantes.

- ✓

Réponse défensive aux stress dus à la chaleur et à la sécheresse
- ✓

Une forte levée
- ✓

Bonne réponse aux fongicides

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 96 jours                 |
| Levée                     | ●●●●●●●●●●               |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●●●               |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●               |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●               |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●●●               |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●               |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Maïs en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |            |                           |            |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1230 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2395

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

NOTES

A6757

GB

RIB

SmartStax<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL™

2950 UTM

Hybride phare, éprouvé, combine potentiel de rendement élevé et qualité des grains. Rendement constant, excellente résistance à la moisissure de l'épi. Visuellement attrayant avec un port de feuilles dressées. Solide ensemble agronomique, permet la flexibilité pour une récolte tardive. Excellent choix comme hybride à double usage (grain et ensilage). Une résistance exceptionnelle à la moisissure de l'épis, année après année.

- ✓

L'hybride profite des systèmes de gestion à haut rendement
- ✓

Excellent ensemble agronomique en semis direct et en systèmes de travail réduit du sol
- ✓

Forte levée, vigueur hâtive

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 99 jours                 |
| Levée                     | ●●●●●●●●●●               |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●●●               |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●               |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●               |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●●●               |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●               |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Maïs en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |            |                           |            |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1245 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2510

Taux de semis 30-36 000 plants par acre

NOTES

A6846

GB

RIB

VT4PRO<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL™

2950 UTM

Protégé contre le ver-gris occidental du haricot (VGOH) et le chrysomèle des racines du maïs. Des tiges et racines solides soutiennent la santé des plants tout au long de la saison, avec un bon séchage pour son groupe de maturité. Polyvalent selon le type de sol et constant dans divers environnements de rendement, cet hybride répond aussi positivement aux applications de fongicide. Un choix fiable en hybride double-fin.

- ✓

Convient à une grande variété de sols pour un placement polyvalent
- ✓

Performance constante dans divers environnements, avec une bonne réponse au fongicide
- ✓

Excellente option grain et ensilage

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 98 jours                 |
| Levée                     | ●●●●●●●●●●               |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●●●               |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●               |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●               |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●●●               |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●               |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Maïs en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |            |                           |            |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1244 DJC

Hauteur du plant:  
M

Type d'épi:  
SF/L/P

Force de la tige  
●●●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2404

Taux de semis 32-35 000 plants par acre

NOTES



A6975

G2

RIB

VTDoublePRO

REFUGE INTÉGRAL

2975 UTM

Hybride polyvalent avec une levée vigoureuse et une bonne santé des plants en fin de saison. Offre une tolérance fiable à la moisissure de l'épi. Fort potentiel de rendement pour son groupe de maturité, jumelé à une excellente qualité de grain. Excelle à des peuplements finaux de 34 000 à 35 000 plants/acre, avec une excellente tenue en fin de saison et une bonne réponse au fongicide en environnements à haut rendement.

- ✓

Excelle à des populations finales 34 à 35 000 plants/ac

✓

Intégrité exceptionnelle tard en saison


✓

Belle réaction aux fongicides dans les environnements à rendement élevé

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturité relative         | 99 jours                                                                                                                  |
| Levée                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Dessiccation du grain     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Rétention de la verdeur   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tolérance à la sécheresse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Poids spécifique          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Santé du plant            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Faibles populations       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations moy.          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations élevées       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Sol marginal              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Un sol productif          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Mais en continu           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| S'adapte au semis direct  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Fusariose de l'épi (GIBB) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tache fusarienne grise   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Réaction aux fongicides   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Anthracnose              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Tache goudronneuse        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2520

Taux de semis 34-36 000 plants par acre

A7197

G8

RIB

SmartStax

REFUGE INTÉGRAL

3050 UTM

Le potentiel de rendement élevé pour cette maturité avec un hybride protégé contre les insectes aériens et ceux dans le sol pour la gamme de maturité 3050 UTM. Plant de grand gabarit, avec épis de taille constante, grâce à des tiges et feuilles en santé. Caractéristiques agronomiques fiables, et très forte intégrité en fin de saison.

- ✓

Très bonne dessiccation permet la flexibilité à la récolte

✓

Excellente santé en fin de saison et intégrité du plant permettent une récolte tardive


✓

Santé exceptionnelle et tolérance aux maladies

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturité relative         | 100 jours                                                                                                                 |
| Levée                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Dessiccation du grain     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Rétention de la verdeur   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tolérance à la sécheresse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Poids spécifique          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Santé du plant            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Faibles populations       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations moy.          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations élevées       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Sol marginal              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Un sol productif          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Mais en continu           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| S'adapte au semis direct  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Fusariose de l'épi (GIBB) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tache fusarienne grise   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Réaction aux fongicides   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Anthracnose              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Tache goudronneuse        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2520

Taux de semis 32-34 000 plants par acre

A7199

G9

RIB

SmartStax

REFUGE INTÉGRAL

3075 UTM

Idéal pour les champs en maïs en continu, offrant un rendement élevé soutenu par des traits défensifs avancés. Présente une levée rapide et une bonne vigueur en début de saison, avec une tige solide et un excellent développement racinaire. Bonne tolérance aux maladies, incluant une excellente résistance à la pourriture de la tige causée par l'anthracnose. Performant sur sols à texture grossière avec des niveaux modérés à élevés d'azote.

- ✓

Solide levée et vigueur en début de saison

✓

Bonnes tiges et très bonnes racines


✓

Bonne tolérance aux maladies, y compris l'anthracnose de la tige

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturité relative         | 101 jours                                                                                                                 |
| Levée                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Dessiccation du grain     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Rétention de la verdeur   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tolérance à la sécheresse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Poids spécifique          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Santé du plant            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Faibles populations       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations moy.          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations élevées       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Sol marginal              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Un sol productif          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Mais en continu           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| S'adapte au semis direct  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Fusariose de l'épi (GIBB) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tache fusarienne grise   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Réaction aux fongicides   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Anthracnose              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Tache goudronneuse        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2525

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

A7181

G

CONVENTIONNEL

3050 UTM

Un hybride conventionnel pour les zones de 3075 UTM. Potentiel de rendement exceptionnel, d'un niveau supérieur. Excellente circonférence de l'épi, style semi-flexible. Chaque épi porte de gros grains, larges et profonds.

- ✓

Meilleures performances obtenues à des populations allant de modérées à plus élevées

✓

À placer de préférence dans un sol qui favorise le développement des racines


✓

Fort et vigoureux à la levée au printemps

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturité relative         | 101 jours                                                                                                                 |
| Levée                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Dessiccation du grain     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Rétention de la verdeur   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tolérance à la sécheresse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Poids spécifique          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Santé du plant            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Faibles populations       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations moy.          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Populations élevées       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Sol marginal              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Un sol productif          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Mais en continu           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| S'adapte au semis direct  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Fusariose de l'épi (GIBB) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tache fusarienne grise   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Réaction aux fongicides   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Anthracnose              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Tache goudronneuse        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2535

Taux de semis 28-34 000 plants par acre



A7275

G2

RIB

VTDoublePRO™

REFUGE INTÉGRAL™

3075 UTM

Un nouvel hybride avec une bonne levée en début de saison et une capacité à exceller dans différents types de sols, en particulier les sols sableux et limoneux. Des tiges et racines fortes, en plus d'une bonne tolérance aux maladies. Ce nouvel hybride présente un excellent potentiel de rendement pour sa maturité.

- ✔

S'adapte à divers types de sols

✔

Des tiges et des racines robustes, tout en étant très saines tard en saison

✔

Optimise la récolte grâce à l'intégrité du plant

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 102 jours                |
| Levée                     | ●●●●●●●●                 |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●                 |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●                 |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●                 |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●                 |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●                 |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Mais en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1260 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF/R/L

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2540

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

NOTES

A7388

G8

RIB

SmartStax™

REFUGE INTÉGRAL™

3175 UTM

Il offre une protection contre les insectes aériens et souterrains. Rendement impressionnant sous de nombreux environnements. Très belle qualité de grain et épi à l'aspect visuel attrayant.

- ✔

S'établit bien sous conditions difficiles

✔

Un excellent choix pour maximiser les surfaces hautement productives

✔

Très forte levée et vigueur printanière hâtive des plantules

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 104 jours                |
| Levée                     | ●●●●●●●●                 |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●                 |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●                 |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●                 |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●                 |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●                 |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Mais en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1270 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2560

Taux de semis 30-36 000 plants par acre

NOTES

A7474

G6

RIB

VT4PRO™

Avec ARNi TECHNOLOGIE

NOUVEAU!

3175 UTM

Hybride conçu pour maximiser le remplissage des grains et tirer pleinement profit de l'eau et des éléments nutritifs tout au long de la saison. Fiable en début de saison, il offre une excellente solidité des tiges et des racines ainsi qu'une bonne intégrité des plants pour faciliter la récolte.

- ✔

Bonne performance selon les populations recommandées

✔

Tire profit d'une disponibilité continue en éléments nutritifs

✔

Très bon dessèchement dans les régions de 3100 à 3300 UTM

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 103 jours                |
| Levée                     | ●●●●●●●●                 |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●                 |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●                 |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●                 |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●                 |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●                 |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Mais en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1409 DJC

Hauteur du plant:  
M

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: T • Point noir: 2748

Taux de semis 33-35 000 plants par acre

NOTES

A7780

G4

RIB

Trecepta™

REFUGE INTÉGRAL™

NOUVEAU!

3225 UTM

Offre un caractère de protection contre le ver-gris occidental des haricots (VGOH). Potentiel de rendement élevé pour sa maturité, avec un excellent dessèchement et une très bonne intégrité des plants en fin de saison pour une récolte efficace.

- ✔

Excellente performance dans les environnements à fort potentiel de rendement

✔

Bonne réponse potentielle aux applications de fongicide

✔

Excellente solidité des tiges et des racines

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Maturité relative         | 108 jours                |
| Levée                     | ●●●●●●●●                 |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●●                 |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●                 |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●                 |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●●                 |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●                 |
|                           | Faibles populations      |
|                           | Populations moy.         |
|                           | Populations élevées      |
|                           | Sol marginal             |
|                           | Un sol productif         |
|                           | Mais en continu          |
|                           | S'adapte au semis direct |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |

Mi-floraison:  
1601 DJC

Hauteur du plant:  
M

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: T • Point noir: 2560

Taux de semis 34-35 000 plants par acre

NOTES



Hybride de référence, de pleine saison. Potentiel de rendement phénoménal, avec une constance remarquable dans la taille des épis. Épis visuellement attrayants avec grains lourds et denses. Santé exceptionnelle des plants en fin de saison, facile à récolter. Style de plant robuste, permet d'obtenir rapidement un couvert végétal complet.

- Épi déterminé, répond à des populations plus élevées
- Rapide à fermer son couvert végétal
- Santé exceptionnelle des plants en fin de saison, facile à récolter

CARACTÉRISTIQUES

Maturité relative

112 jours

Levée

●●●●●●●●

Dessiccation du grain

●●●●●●●●

Rétention de la verdeur

●●●●●●●●

Tolérance à la sécheresse

●●●●●●●●

Poids spécifique

●●●●●●●●

Santé du plant

●●●●●●●●

GESTION

Faibles populations

●●●●●●●●

Populations moy.

●●●●●●●●

Populations élevées

●●●●●●●●

Sol marginal

●●●●●●●●

Un sol productif

●●●●●●●●

Maïs en continu

●●●●●●●●

S'adapte au semis direct

●●●●●●●●

TOLÉRANCE À LA MALADIE

Brûlure sept. (feuilles)

●●●●●●●●

Tache fusarienne grise

●●●●●●●●

Anthraxnose

●●●●●●●●

Fusariose de l'épi (GIBB)

●●●●●●●●

Réaction aux fongicides

●●●●●●●●

Tache goudronneuse

●●●●●●●●

NOTES

Mi-floraison:

1340 DJC

Hauteur du plant:

M

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N • Point noir: 2595

Taux de semis 34-40 000 plants par acre

Soutien agronomique pour chaque acre.

Semences PRIDE s'engage à vous accompagner à chaque étape de la saison grâce à des ressources agronomiques à jour et une expertise personnalisée pour vous aider à réussir.

Scannez le code QR pour découvrir les ressources saisonnières de FieldTalk, des conseils de gestion des cultures, des mises à jour au champ et les événements de votre région.

Conditions au champ


Stratégies de culture

Gestion de la récolte

Expertise génétique

En savoir plus

# Guide de la flexibilité de l'épi de maïs



Comprendre la flexibilité des épis d'un hybride est essentiel pour l'adapter aux conditions de rendement propres à votre ferme. La flexibilité des épis fait référence à la capacité génétique d'un hybride à ajuster les caractéristiques de l'épi et des grains selon les conditions de croissance, maximisant ainsi son potentiel de rendement.

Nous catégorisons la flexibilité des épis selon la façon dont un hybride augmente le nombre ou la taille des grains à mesure que le rendement s'améliore, en trois types principaux:

- Flexibilité du tour de l'épi: Ajout de grains récoltables autour de l'épi en réponse au stress en début de saison, à la densité de semis et à la disponibilité en nutriments (stades V4 à V6).
- Flexibilité de la longueur de l'épi: Production de grains supplémentaires en longueur en réponse à la gestion et aux conditions environnementales en milieu de saison (V12 à VT).
- Flexibilité du grain: Variation de la taille et du poids des grains selon la santé de la plante, la disponibilité en nutriments et les conditions de fin de saison (R2 à R6).

En début de saison, chaque hybride possède un potentiel génétique défini pour la taille de l'épi et le nombre de grains. Au fil de la saison, les facteurs environnementaux influencent sa flexibilité: l'hybride ajuste alors la longueur, le nombre de rangs ou la taille des grains pour optimiser le rendement. Cette flexibilité permet à la plante de gérer ses ressources de façon efficace en fonction des conditions changeantes.

Comprendre la flexibilité des épis d'un hybride vous aide à choisir les variétés les mieux adaptées à votre sol, à votre climat et à votre gestion, favorisant un rendement maximal et des récoltes constantes.



# Hybrides **maïs ensilage**

Les hybrides de maïs ensilage Semences PRIDE sont sélectionnés pour leur qualité de fourrage, leur digestibilité et leur rendement élevé, répondant aux besoins des fermes laitières et bovines canadiennes. Notre gamme met l'accent sur la digestibilité de la fibre, la teneur en amidon et la performance agronomique afin de maximiser la production de lait et de viande. Les hybrides désignés EDF (Fibres Digestibles Efficaces) et EDP (Deux Fins) sont choisis pour leur valeur nutritionnelle supérieure, avec une digestibilité accrue des fibres et des protéines, favorisant une meilleure ingestion et une efficacité animale optimisée. Adaptés à différentes régions et rations, nos hybrides offrent valeur alimentaire, rendement et fiabilité.

## Table des matières

Découvrez les marques Semences PRIDE\* présentées dans cette section. Les détails complets des hybrides se trouvent aux pages suivantes.

|    |                                   |    |                  |
|----|-----------------------------------|----|------------------|
| 32 | AS1017RR EDF                      | 38 | A5977G8 RIB      |
| 32 | AS1018G2 EDF RIB                  | 38 | A6015 C          |
| 33 | A4646G2 RIB                       | 39 | A6016RR          |
| 33 | A4848G2 RIB                       | 39 | A6566G8 RIB      |
| 34 | A5175G2 RIB <i>*NOUVEAU*</i>      | 40 | AS1097G8 EDF RIB |
| 34 | AS1027RR EDF                      | 40 | A6757G8 RIB      |
| 35 | AS1028G2 EDF RIB                  | 41 | A6975G2 RIB      |
| 35 | AS1047RR EDF                      | 41 | A7197G8 RIB      |
| 36 | AS1057RR EDF <i>*NOUVEAU*</i>     | 42 | A7181 C          |
| 36 | AS1058G2 EDF RIB <i>*NOUVEAU*</i> | 42 | A7275G2 RIB      |
| 37 | A5580G4 RIB <i>*NOUVEAU*</i>      | 43 | A8303G8 RIB      |
| 37 | A5775G2 RIB                       |    |                  |

\*Tous les codes de produits Semences PRIDE mentionnés sont des noms de marque exclusifs pour des hybrides uniques enregistrés au Canada.

### Emportez le guide au champ.

Scannez le code QR pour consulter les plus récents résultats d'essais en maïs ensilage et les données de performance au champ.





AS1017

G1

RR EDF

Roundup Ready 2

MAÏS

2050-2250 UTM

Choix idéal pour production d'ensilage en saison courte. Superbes rendements fourragers d'un maïs à haute teneur en énergie et digestibilité, offrant des possibilités dans les zones de culture à saison plus courte. Taux de séchage lent (grains) qui préserve la qualité des aliments pour animaux de façon fiable et constante, à un taux d'humidité idéal. Forte levée et vigueur printanière agressive. Convient très bien aux exploitations laitières et bovines (parc d'engraissement). Grande plante et hauteur uniforme. Produit des épis de taille constante avec grains cornés sur rafles blanches.

- ✓

Valeurs élevées pour le lait et la viande bovine à l'acre

✓

Largement adapté d'est en ouest, sous des environnements de culture variés

✓

Accepte les sols difficiles, variables, ainsi que les sols très productifs


| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 71-76 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

EDF

EDP



Mi-floraison:

1125 DJC

Hauteur du plant:

G

Type d'épi:

D

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: T

Taux de semis 34-36 000 plants par acre

AS1018

G2

EDF RIB

VT Double PRO

REFUGE INTÉGRAL

2050-2250 UTM

Hybride spécifique pour l'ensilage avec caractère de protection contre les insectes au-dessus du sol. Choix idéal pour production d'ensilage en saison courte. Superbes rendements fourragers d'un maïs à haute teneur en énergie et digestibilité, offrant des possibilités dans les zones de culture à saison plus courte. Son taux de séchage lent (grains) préserve la qualité des aliments pour animaux de façon fiable et constante, à un taux d'humidité idéal. Forte levée et vigueur printanière agressive. Convient très bien aux exploitations laitières et bovines (parc d'engraissement). Grande plante, hauteur uniforme. Produit des épis de taille constante avec grains cornés sur rafles blanches.

- ✓

Valeurs élevées pour le lait et la viande bovine à l'acre

✓

Largement adapté d'est en ouest, sous des environnements de culture variés

✓

Accepte les sols difficiles, variables, ainsi que les sols très productifs


| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 71-76 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

EDF

EDP



Mi-floraison:

1125 DJC

Hauteur du plant:

G

Type d'épi:

D

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: T

Taux de semis 34-36 000 plants par acre

A4646

G2

RIB

VT Double PRO

REFUGE INTÉGRAL

2175-2275 UTM

Hybride à double usage (grains, ensilage) avec l'avantage d'un caractère de protection contre les insectes aériens. Cet hybride est polyvalent en ce qui a trait aux divers types de travaux du sol et de textures du sol. Cet hybride permet aux producteurs de récolter tôt dans la saison pour un excellent rendement énergétique.

- ✓

Maturité hâtive des grains, garantissant une teneur élevée en amidon et une récolte hâtive

✓

Fort en ce qui a trait à la levée, à la tenue au champ et à la santé du plant

✓

Combine une très bonne digestibilité et une forte teneur en amidon pour un rendement énergétique élevé


| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 75-77 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

EDF

EDP



Mi-floraison:

1125 DJC

Hauteur du plant:

MG

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

A4848

G2

RIB

VT Double PRO

REFUGE INTÉGRAL

2375 UTM

Il offre un caractère de protection contre les insectes aériens grâce à ses traits. Présente des épis larges de longueur moyenne produisant un grain propre et de haute qualité. Affiche une performance de rendement stable dans sa zone de maturité, avec un bon ratio rendement/humidité.

- ✓

Solide potentiel de rendement sous conditions de stress

✓

Fort et vigoureux à la levée au printemps

✓

Résistance impressionnante (tige, racines) tout au long de la saison


| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 80 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Protéine brute            | ●●●●●●●● |
| FDNd                      | ●●●●●●●● |
| Amidon                    | ●●●●●●●● |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●● |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | --       |

EDF

EDP



Mi-floraison:

1130 DJC

Hauteur du plant:

M

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison H • Point noir: 2240

Taux de semis 32-36 000 plants par acre




## 2425 UTM

☒ Bonne tolérance au stress et fort potentiel pour l'ensilage

[illegible]

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Tache fusarienne grise   | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Anthracnose              | ● ● ● ● ● ● ● ● |



**Taux de semis 32-35 000 plants par acre**


[illegible]

## 2250-2425 UTM

- ✓ Excellente rétention de la verdure qui permet une fenêtre de récolte élargie

|                           | Maturité relative | 77-80 jours |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Levée                     | ●●●●●●●●          |             |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●          |             |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●          |             |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●          |             |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●          |             |
| FDNd                      | ●●●●●●●●          |             |
| Amidon                    | ●●●●●●●●          |             |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●          |             |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●          |             |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● |
| Anthracnose              | ●●●●●●●● |



**Taux de semis 30-32 000 plants par acre**


## This image shows a vertical rectangular page filled with approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines, resembling notebook paper. The lines are thin and extend across the width of the page, leaving small gaps between them. There is no handwriting or other markings on the page.

## 2250-2425 UTM

☑ Excellent choix pour les producteurs laitiers  
(ensilage, rendement, teneur en énergie)

|                           | Maturité relative | 77-80 jours |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Levée                     | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| FDNd                      | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Amidon                    | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Tache fusarienne grise   | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Anthracnose              | ● ● ● ● ● ● ● ● |



**Taux de semis 30-32 000 plants par acre**


[illegible]

## 2300-2475 UTM

☒ Extrêmement bien adapté aux besoins des producteurs laitiers  
et aux parcs d'engraissement

|                           | Maturité relative | 78-82 jours |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Levée                     | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| FDNd                      | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Amidon                    | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●●●        | ●●●●●●●●●●  |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Tache fusarienne grise   | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Anthracnose              | ● ● ● ● ● ● ● ● |



**Taux de semis 30-32 000 plants par acre**

[illegible]



AS1057

G1

RR EDF

Roundup Ready 2

MAÏS

NOUVEAU!

2325-2475 UTM

Hybride feuillu à tonnage élevé offrant un bon équilibre entre la stature du plant et le rendement, conçu pour maximiser la qualité du fourrage et la souplesse d'alimentation. Ses épis longs et élancés produisent un amidon de qualité et permettent une fenêtre de récolte prolongée. Sa haute digestibilité favorise une excellente valeur alimentaire.

- Hybride hâtif offrant un bon équilibre entre stature et rendement
- Épis longs et élancés favorisant une récolte prolongée
- Excellent choix pour les producteurs laitiers


CARACTÉRISTIQUES

GESTION

|                           |             |                     |          |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Maturité relative         | 78-82 jours | Faibles populations | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●●    | Populations moy.    | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    | Populations élevées | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●●    | Sol marginal        | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    | Sol productif       | ●●●●●●●● |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    | Mais en continu     | ●●●●●●●● |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |                     |          |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |                     |          |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |                     |          |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |                     |          |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N

Taux de semis 30-32 000 plants par acre

AS1058

G2

EDF RIB

VT Double PRO

REFUGE INTÉGRAL

NOUVEAU!

2350-2525 UTM

Cet hybride convient parfaitement aux exploitations axées sur l'ensilage, avec un bon équilibre entre rendement fourrager et densité énergétique. La protection intégrée contre les insectes aériens soutient la santé des plants toute la saison. Il performe de façon optimale à faible ou moyenne densité, permettant de maximiser la valeur fourragère avec une gestion efficace.

- Excellente solidité des tiges et des racines tout au long de la saison
- Épis longs et fins produisant un grain riche en amidon et de qualité
- Bon potentiel de rendement en conditions de stress, avec une très bonne tolérance au dessèchement


CARACTÉRISTIQUES

GESTION

|                           |          |                     |          |
|---------------------------|----------|---------------------|----------|
| Maturité relative         | 84 jours | Faibles populations | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.    | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Populations élevées | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●● | Sol marginal        | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | Sol productif       | ●●●●●●●● |
| Protéine brute            | ●●●●●●●● | Mais en continu     | ●●●●●●●● |
| FDNd                      | ●●●●●●●● |                     |          |
| Amidon                    | ●●●●●●●● |                     |          |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●● |                     |          |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●● |                     |          |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N

Taux de semis 30-32 000 plants par acre

A5580

G4

RIB

Trecepta

REFUGE INTÉGRAL

MAÏS

NOUVEAU!

2650 UTM

Hybride à floraison hâtive avec une forte vigueur au semis et une protection contre le ver-gris des haricots de l'Ouest. Démarrage rapide, excellente solidité des tiges, spathes bien ouvertes pour un bon séchage et bon poids spécifique. Performant à densité moyenne à élevée, avec un grain propre et un tonnage modéré en ensilage—un choix polyvalent pour un usage double.

- Optimise la flexibilité d'épi et le rendement à densité moyenne ou élevée
- Floraison hâtive favorisant le remplissage du grain et un bon séchage grâce à des spathes ouvertes
- Hybride à ensilage modéré, avec un bon tonnage et une qualité fourragère moyenne


CARACTÉRISTIQUES

GESTION

|                           |          |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 85 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | ●●●●●●●● |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: H • Point noir: 2240

Taux de semis 34-36 000 plants par acre

A5775

G2

RIB

VT Double PRO

REFUGE INTÉGRAL

NOUVEAU!

2650 UTM

Offre un rendement constant, même en conditions de stress. Cet hybride à démarrage rapide présente une très bonne levée et s'établit rapidement sur une variété de types de sols. Parfait pour ceux qui cherchent à maximiser l'amidon d'un maïs double fin. Belle hauteur, il garde sa verdure et sa santé de plante tard à l'automne jusqu'à la récolte.

- Rendement fiable et constant dans des conditions de culture diverses
- Levée rapide et forte croissance initiale pour bien amorcer la saison
- Épi particulier et rare avec un grain denté énergétique et une rafle blanche digestible


CARACTÉRISTIQUES

GESTION

|                           |          |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Maturité relative         | 86 jours | Faibles populations      | ●●●●●●●● |
| Levée                     | ●●●●●●●● | Populations moy.         | ●●●●●●●● |
| Dessiccation du grain     | ●●●●●●●● | Populations élevées      | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdure   | ●●●●●●●● | Sol marginal             | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● | Un sol productif         | ●●●●●●●● |
| Poids spécifique          | ●●●●●●●● | Mais en continu          | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● | S'adapte au semis direct | ●●●●●●●● |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                           |          |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Fusariose de l'épi (GIBB) | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Réaction aux fongicides   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse        | —        |



Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: H • Point noir: 2320

Taux de semis 32-36 000 plants par acre



A5977

GB

RIB

SmartStax<sup>MD</sup>  
REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

2600-2700 UTM

Double usage (ensilage et grain), pour un potentiel de rendement maximal impressionnant. Valeur ajoutée pour le caractère de protection contre les insectes aériens et souterrains, offre ainsi une plus grande flexibilité en culture maïs sur maïs. Excellente levée, vigueur printanière agressive des plantules. Hauteur du plant (entre moyen et grand) et une taille constante de l'épi. Permet d'être positionné sur une large plage d'environnements. Peut profiter d'une densité accrue de population.

- ✓

Excellence, côtés tiges et racines
- ✓

Forte valeur protéique par tonne
- ✓

Combine teneur élevée en amidon et digestibilité

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 84-88 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

Mi-floraison:

1135 DJC

Hauteur du plant:

MG

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

NOTES

A6015

C

CONVENTIONNEL

2650-2775 UTM

Un incontournable pour le maïs fourrager de culture principale, cet hybride conventionnel offre d'excellentes caractéristiques double usage avec un rendement élevé en ensilage. Il allie une forte teneur en amidon et une bonne digestibilité pour produire un ensilage riche en énergie et un rendement laitier par acre remarquable. Reconnu pour son fort tonnage et sa rétention de la verdeur durable, c'est un choix fiable pour une performance constante.

- ✓

Fort potentiel de rendement en fourrage dans divers environnements
- ✓

Un ensilage très riche en énergie et des niveaux de lait/acre impressionnants
- ✓

Rétention de la verdeur et santé durables

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 86-90 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

Mi-floraison:

1200 DJC

Hauteur du plant:

M

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N

Taux de semis 30-34 000 plants par acre

NOTES

A6016

G1

RR

Roundup Ready<sup>2</sup>  
MAÏS

2650-2775 UTM

La norme en culture de maïs fourrager. Excellentes caractéristiques à double usage offrant un tonnage élevé en ensilage. Combine teneur élevée en amidon et digestibilité pour fournir un superbe ensilage dense en énergie et des niveaux de lait/acre impressionnants.

- ✓

La norme en culture de maïs fourrager de culture principale, avec rendement et qualité constants selon les conditions
- ✓

Rétention de la verdeur prolongée soutenant la vigueur et la santé des plants toute la saison
- ✓

Produit un ensilage riche en énergie et en qualité, soutenant une forte production laitière par acre

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 86-90 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | —        |

Mi-floraison:

1165 DJC

Hauteur du plant:

M

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N

Taux de semis 30-34 000 plants par acre

NOTES

A6566

GB

RIB

SmartStax<sup>MD</sup>  
REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

2700-2850 UTM

Hybride à double usage, ensilage et grain. Combine un ratio idéal rendement/tonnage, digestibilité et teneur élevée en amidon et en énergie. Rétention de la verdeur et santé des plants durables. Idéal pour culture maïs sur maïs grâce à son caractère de protection à valeur ajoutée contre les insectes dans le sol et hors sol.

- ✓

Combine un ratio idéal de rendement/tonnage
- ✓

Ratio idéal en rendement, digestibilité et teneur élevée en amidon et en énergie
- ✓

Idéal pour la culture de maïs en continu

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 88-95 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | ●●●●●●●● |

Mi-floraison:

1230 DJC

Hauteur du plant:

MG

Type d'épi:

SF

Force de la tige

●●●●●●●●

Résistance des racines

●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)

Floraison: N

Taux de semis 32-36 000 plants par acre

NOTES



AS1097

GB

SmartStax<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

EDF RIB

2775-2925 UTM

Hybride feuillu hautement digestible avec caractère de protection à valeur ajoutée contre les insectes aériens et souterrains, surtout pour culture maïs sur maïs. Fenêtre de récolte large et idéale, avec taux de dessiccation lent (plant, épi). Maintenir la population entre 30 à 32 000 plants par acre pour un équilibre maximal entre digestibilité des fibres et amidon. Gros épis avec grains dentés pour augmenter la digestibilité.

- ✔

Hybride feuillu hautement digestible
- ✔


Offre la protection contre les insectes aériens et souterrains
- ✔

Excellent choix afin de constituer une base solide pour votre ration

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 91-98 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | —        |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | ●●●●●●●● |



Mi-floraison:  
1245 DJC

Hauteur du plant:  
G

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N/T

Taux de semis 30-32 000 plants par acre

A6757

GB

SmartStax<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

RIB

2775-2925 UTM

Choix éprouvé à double usage (grains et ensilage). Rétention de la verdeur et santé durables. Idéal pour culture maïs sur maïs grâce à son caractère de protection à valeur ajoutée contre les insectes dans le sol et hors sol. Performe bien sur des sols variés et sous des conditions variées.

- ✔

Maintient son rendement et sa taille sous environnements de stress
- ✔


Tonnage, digestibilité, teneur en amidon élevés, pour des niveaux impressionnants de lait-viande/acre
- ✔

Idéal pour culture maïs sur maïs, porteur d'un caractère de protection à valeur ajoutée contre les insectes dans le sol et hors sol

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 92-98 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | ●●●●●●●● |



Mi-floraison:  
1245 DJC

Hauteur du plant:  
MG

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N

Taux de semis 30-38 000 plants par acre

A6975

G2

VTDoublePRO<sup>™</sup>

REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

RIB

2800-2925 UTM

Hybride polyvalent avec une levée vigoureuse et une bonne santé des plants en fin de saison. Offre une tolérance fiable à la moisissure de l'épi. Fort potentiel de rendement pour son groupe de maturité, jumelé à une excellente qualité de grain. Excelle à des peuplements finaux de 34 000 à 35 000 plants/acre, avec une excellente tenue en fin de saison et une bonne réponse au fongicide en environnements à haut rendement.

- ✔

Excelle à des populations finales 30 à 34 000 plants/ac
- ✔


Intégrité exceptionnelle tard en saison
- ✔

Belle réaction aux fongicides dans les environnements à rendement élevé

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION  |
|---------------------------|----------|
| Maturité relative         | 99 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●● |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●● |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●● |
| Santé du plant            | ●●●●●●●● |
| Protéine brute            | ●●●●●●●● |
| FDNd                      | ●●●●●●●● |
| Amidon                    | ●●●●●●●● |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●● |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●● |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | —        | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | ●●●●●●●● |



Mi-floraison:  
1260 DJC

Hauteur du plant:  
M

Type d'épi:  
SF/L/P

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N • Point noir: 2520

Taux de semis 30-34 000 plants par acre

A7197

GB

SmartStax<sup>MD</sup>

REFUGE INTÉGRAL<sup>™</sup>

RIB

2850-3025 UTM

Très bon choix à double usage pour l'ensilage et les grains. Contenu élevé en grains, porteur de plus d'amidon, pour de forts niveaux lait-viande/acre. Rétention de la verdeur et santé durables. Idéal pour culture maïs sur maïs grâce à son caractère de protection à valeur ajoutée contre les insectes dans le sol et hors sol.

- ✔

Qualités agronomiques complètes
- ✔


Combinaison impressionnante de tonnage d'ensilage et de grains au contenu élevé pour plus d'amidon donnant de forts niveaux lait/acre
- ✔

Maintient son rendement et sa taille sous environnements de stress

| CARACTÉRISTIQUES          | GESTION     |
|---------------------------|-------------|
| Maturité relative         | 95-99 jours |
| Levée                     | ●●●●●●●●    |
| Tolérance à la sécheresse | ●●●●●●●●    |
| Rétention de la verdeur   | ●●●●●●●●    |
| Santé du plant            | ●●●●●●●●    |
| Protéine brute            | ●●●●●●●●    |
| FDNd                      | ●●●●●●●●    |
| Amidon                    | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par acre      | ●●●●●●●●    |
| Lait/viande par tonne     | ●●●●●●●●    |

### TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                          |          |                       |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Brûlure sept. (feuilles) | ●●●●●●●● | Réaction au fongicide | ●●●●●●●● |
| Tache fusarienne grise   | ●●●●●●●● | Flétrissure de Goss   | ●●●●●●●● |
| Anthraxnose              | ●●●●●●●● | Tache goudronneuse    | ●●●●●●●● |



Mi-floraison:  
1250 DJC

Hauteur du plant:  
G

Type d'épi:  
SF

Force de la tige  
●●●●●●●●

Résistance  
des racines  
●●●●●●●●

Unités thermiques de croissance (UTC)  
Floraison: N

Taux de semis 32-34 000 plants par acre







## NOTES

[illegible]

## NOTES

[illegible]



# Les variétés soya

La gamme de soya Semences PRIDE offre un rendement élevé et une performance constante dans des environnements variés. Soutenu par une génétique de pointe et des traits technologiques avancés, nos variétés de soya proposent des caractéristiques agronomiques solides, une tolérance éprouvée aux maladies et des options de maturité adaptées aux conditions de culture canadiennes. Que vous recherchiez un rendement maximal, une bonne tenue ou une flexibilité à la récolte, nos soya sont sélectionnés et testés pour performer.

## Table des matières

Découvrez les marques Semences PRIDE\* présentées dans cette section. Les détails complets des variétés se trouvent aux pages suivantes.

|    |                              |    |                             |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 52 | PS0011 XRN                   | 57 | PS1022 EN                   |
| 52 | PS0036 XF <i>*NOUVEAU*</i>   | 57 | PS1224 EN                   |
| 53 | PS00525 XRN <i>*NOUVEAU*</i> | 58 | PS1344 XFN                  |
| 53 | PS0098 XR                    | 58 | PS1777 EN <i>*NOUVEAU*</i>  |
| 54 | PS0225 XRN <i>*NOUVEAU*</i>  | 59 | PS1923 XFN                  |
| 54 | PS0326 EN <i>*NOUVEAU*</i>   | 59 | PS2120 EN                   |
| 55 | PS0521 XRN                   | 60 | PS2226 XFN <i>*NOUVEAU*</i> |
| 55 | PS0779 XRN                   | 60 | PS2322 XFN                  |
| 56 | PS0890 EN <i>*NOUVEAU*</i>   | 61 | PS2325 EN <i>*NOUVEAU*</i>  |
| 56 | PS0944 XRN                   | 61 | PS2923 EN                   |

\*Tous les codes de produits Semences PRIDE mentionnés sont des noms de marque exclusifs pour des variétés uniques enregistrés au Canada.

### Emportez le guide au champ.

Scannez le code QR pour consulter les plus récents résultats d’essais des variétés de soya et les données de performance au champ.





# Protection des semences de soya

Semez en toute confiance, sachant que vous avez choisi un système de traitement des semences de qualité pour votre soya. **Le traitement des semences AgriShield®** s'appuie sur une performance éprouvée. Il offre une protection de premier ordre contre les insectes, les nématodes et les maladies des plantules. Quel que soit le défi, AgriShield® est toujours en fonction.

Comme seule option fongicide dans le soya, **AgriShield®FT** utilise le traitement de semences Vayantis® IV, afin de protéger le soya contre une large gamme de maladies des semences et des plantules en début de saison, y compris le Phytophthora. Il offre le plus large spectre de suppression du Pythium sur le marché. Vayantis® IV offre également un mode d'action unique, sans résistance croisée connue. De plus, le Rooting Power® de Vibrance® permet que le soya s'établisse plus rapidement.

En utilisant AgriShield® FT comme base, **AgriShield® Max** inclut le traitement de semences de soya Fortenza®. Le tout permet la suppression de la chrysomèle du haricot, de la mouche des semis, du ver fil de fer, du hanneton européen, du hanneton commun et du ver-gris noir. Même en présence de forte pression d'insectes, Fortenza® aide les producteurs à construire un solide peuplement de soya à croissance plus rapide et plus uniforme.

## Inoculants

La majorité des soya AgriShield®FT et AgriShield®Max offrent une option d'inoculant à double action.

## Semences non traitées

Cette option est offerte; toutefois, elle n'inclut pas de protection contre les pertes de peuplement causées par les insectes, les problèmes liés aux semences ou les maladies transmises par le sol.

*Veuillez communiquer avec votre directeur régional des ventes pour connaître la disponibilité et obtenir plus de détails.*

Conçu pour une meilleure implantation.



Des plants vigoureux et une croissance saine dès le départ.



# Légende du soya

## Caractéristiques agronomiques

### Groupe de maturité (GM)

En fonction de la maturité physiologique et de l'humidité à la récolte.

### Levée

Cote basée sur la vitesse de levée et la longueur de l'hypocotyle. Une bande piontillée plus longue indique un soya à levée rapide et à un hypocotyle long.

### Tenue au champ

Les cotes de résistance à la verse sont prises à maturité. La bande pointillée la plus longue signifie que toutes les plantes sont dressées. La bande pointillée la plus longue signifie que tous les plants sont plats.

### Adaptabilité au semis direct

Puisque les sols de semis direct sont souvent plus froids et plus humides, cette cote est étroitement liée à la levée et à la croissance précoce. La bande pointillée la plus longue indique une excellente levée et une vigueur précoce en environnements de semis direct.

## Évaluations des produits

Les variétés de soya présentant les mêmes gènes de résistance peuvent avoir des performances différentes en raison des différents niveaux de tolérance au champ. Les pointages et les caractéristiques sont attribués par Semences PRIDE selon des comparaisons avec des produits de maturité similaire lors de tests internes au champ. Les performances peuvent varier d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre selon les conditions locales de culture, de sol et météorologiques. Les producteurs devraient évaluer les données provenant de plusieurs endroits et de plusieurs années lorsque possible, tout en tenant compte de l'incidence de ces conditions sur leurs champs.

### Évaluation à partir des bandes pointillées

Les bandes pointillées visibles indiquent les cotes. Elles remplacent les valeurs numériques utilisées dans les précédents guides de semences.

●●●●●●●●  
Indique une cote modérée (<6)

●●●●●●●●  
Indique une bonne cote (6 à 7)

●●●●●●●●  
Indique une très bonne cote (8)

●●●●●●●●  
Indique une excellente cote (9)

—  
Indique qu'aucune valeur n'est disponible ou qu'elle n'est pas applicable

## Santé du plant

### Tolérance au champ à *phytophthora*

Les variétés sensibles à la pourriture phytophthoréenne ne sont pas toutes endommagées au même degré. Les variétés très tolérantes poussent et produisent de bons rendements une fois passé le stade de la plantule. Les bandes pointillées les plus longues indiquent une tolérance plus élevée.

### Résistance à la race de Phytophthora

Aucune = Pas de résistance spécifique à la race.

**Rps1a** indique la résistance aux races 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36 et 37.

**Rps1c** indique la résistance aux races 1-3, 6-11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28-30, 32, 34, et 36.

**Rps1k** indique la résistance aux races 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36 et 37.

**Rps3a** indique la résistance aux races 1, 2, 5, 8, 9, et autres.

### Résistance au nématode à kyste du soya

Source de résistance spécifiée dans chaque produit.

### Tolérance à la pourriture sclérotique du soya

Les bandes pointillées plus longues indiquent une tolérance plus élevée. Les bandes pointillées moyennes indiquent une cote acceptable, même sous conditions modérément sévères.

### Syndrome de la mort subite

Les bandes pointillées plus longues indiquent une tolérance plus élevée. Les bandes pointillées moyennes indiquent une cote acceptable, même sous conditions modérément sévères.

## Zone de placement préférée

Les zones de placement préférées représentent les meilleures zones d'adaptation d'un produit sur la base d'observations sur le terrain, de données génétiques et de données d'essai. Les produits peuvent ne convenir qu'à une partie d'une zone. Ils peuvent être performants dans d'autres zones non identifiées. Contactez votre équipe de vente pour obtenir plus de détails.

## Valeur élevée des nouvelles semences de marque ++

### Technologie la plus récente

- Technologie de soya au rendement le plus élevé
- Principaux choix en matière de traitement des semences

### Germination et qualité fiables

## Caractéristiques du plant

### Hauteur du plant

Court, moyennement court, moyen, moyennement grand ou grand.

### Type de plant

L'importance de la ramification aux nœuds inférieurs de la tige: Mince, Moyen, Moyen-Buissonnant, Buissonnant.

### Couleur de la pubescence

Couleur du plant à la récolte.

### Couleur du hile

Couleur de la zone de la fève qui s'attache à la paroi de la gousse.

### Couleur de la fleur


Couleur de la fleur pendant la floraison.

### Couleur de la gousse

Couleur de la gousse à la récolte.

### Diagramme des caractéristiques des plants

L'exemple ci-dessous illustre les caractéristiques principales des plants utilisées pour décrire chaque produit dans le guide.



## Versions des Technologies

Présentement, dans le soya, ces versions des technologies à valeur ajoutée sont proposées:



## Choix des herbicides

Compte tenu des choix d'herbicides offerts sur le marché canadien, il importe plus que jamais de planifier soigneusement et de tenir compte des étiquettes lors de la sélection et de la gestion de soyas tolérants aux herbicides.

| <b>Roundup® (glyphosate)</b> | ●            | ●            | ●            |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Glufosinate</b>           | Incompatible | ●            | ●            |
| <b>Dicamba*</b>              | ●            | ●            | Incompatible |
| <b>2,4-D**</b>               | Incompatible | Incompatible | ●            |

## Rôle clé des droits de propriété intellectuelle

La création de nouvelles variétés nécessite un investissement à long terme et des années de travail. Le financement du travail des sélectionneurs et des chercheurs pour créer des variétés permet d'obtenir des cultures améliorées, plus performantes en rendement, et en pureté. Il importe de protéger les droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les technologies de cultures, tout comme les brevets protègent le design de votre moissonneuse-batteuse.

Le respect des droits de propriété intellectuelle vous permet d'obtenir de nouvelles variétés qui:

- Augmenteront la résistance aux conditions de stress
- Amélioreront les performances agronomiques
- Satisferont les besoins de l'industrie
- Offriront des produits à valeur ajoutée
- Amélioreront la compétitivité

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site: [seedgrowers.ca/fr](https://seedgrowers.ca/fr)



PS0011

X  
R  
N

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

2300 UTM



Variété Roundup Ready 2 Xtend® idéalement adaptée aux zones hâtives GM 00 et tardives GM 000. Valeur ajoutée de protection contre la pourriture phytophthoréenne des racines Rps 1c.

- ☒ L'excellente tenue au champ, associée à la protection NKS en font une variété qui convient parfaitement à de grandes superficies
- ☒ Très bonne résistance à la moisissure blanche et tolère la carence en fer
- ☒ Convient bien à la plupart des largeurs de rangs

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                         | GESTION                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>          | Sol mal drainé <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>               |
| Tenue au champ <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                 |
| Graines par kg 6200-6500                                                                                                                 | Sol productif <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                |
| Groupe de maturité 00,0                                                                                                                  | Adaptabilité au semis direct <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                                                                                          | Tolérance aux herbicides RR, Xtend                                                                                                                     |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                      |           |                                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pl.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1c    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Syndrome de la mort subite           | –         |                                               |                                                                                                                           |



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

PS0036

X  
F

XTENDFLEX  
SOYA

2375 UTM



Variété de soya branchue offrant un fort potentiel de rendement pour sa maturité et une excellente tenue. Bien adaptée au semis direct, elle tire profit de son branchement dans différentes largeurs de rangs et populations, tout en offrant une performance constante dans divers environnements. Sa bonne tolérance aux maladies et la technologie XtendFlex® procurent une protection accrue tout au long de la saison.

- ☒ Bien adaptée au semis direct
- ☒ Bonne tolérance aux maladies
- ☒ Tire profit de son branchement dans différentes largeurs de rangs et populations

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                         | GESTION                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>          | Sol mal drainé <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>               |
| Tenue au champ <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                 |
| Graines par kg –                                                                                                                         | Sol productif <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                |
| Groupe de maturité 00,3                                                                                                                  | Adaptabilité au semis direct <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                                                                                          | Tolérance aux herbicides Dicamba, Glyphosate, Glufosinate                                                                                              |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                      |        |                                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes      | –      | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1c | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Syndrome de la mort subite           | –      |                                               |                                                                                                                           |



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

PS00525

X  
R  
N

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

2400 UTM



Idéale pour les sols loameux et argileux, cette variété maximise la hauteur des plants à densité moyenne ou élevée. Sa vigueur et sa robustesse en font un excellent choix en semis direct. Elle offre une levée rapide dans des conditions printanières difficiles et une fermeture du couvert supérieure à la moyenne. Son potentiel de rendement est solide pour son groupe de maturité, soutenu par une bonne tolérance au sclérotinia et une excellente tenue de tige.

- ☒ Excellent potentiel de rendement pour son groupe de maturité, avec une performance constante dans divers environnements
- ☒ Port agressif avec une bonne tolérance au sclérotinia
- ☒ Fermeture du couvert supérieure à la moyenne, pour une couverture efficace et suppression des mauvaises herbes

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                         | GESTION                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>          | Sol mal drainé <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>               |
| Tenue au champ <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                 |
| Graines par kg 5300-6200                                                                                                                 | Sol productif <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                |
| Groupe de maturité 00,5                                                                                                                  | Adaptabilité au semis direct <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                                                                                          | Tolérance aux herbicides Dicamba, Glyphosate                                                                                                           |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                      |           |                                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pl.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1c    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Syndrome de la mort subite           | –         |                                               |                                                                                                                           |



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

PS0098

X  
R

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

2500 UTM



Excellente performance sous travail minimum du sol et tous les espacements de rangs. Placer sur des sols ayant des antécédents de pourriture phytophthoréenne. Répond à une gestion intensive, mais est suffisamment résistant pour les environnements à plus faible rendement. Évitez les champs avec des populations connues de nématodes à kyste du soya (NKS). Conserve sa hauteur et présente une excellente largeur sous stress.

- ☒ Très bonne tolérance au stress avec un fort potentiel de rendement
- ☒ Valeur ajoutée, protection contre la pourriture phytophthoréenne Rps 1k
- ☒ Possède la capacité de rendement pour concurrencer sur les marchés hâtifs du Groupe 0

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                         | GESTION                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>          | Sol mal drainé <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>               |
| Tenue au champ <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                 |
| Graines par kg 5500-7100                                                                                                                 | Sol productif <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                |
| Groupe de maturité 0,9                                                                                                                   | Adaptabilité au semis direct <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                                                                                          | Tolérance aux herbicides RR, Xtend                                                                                                                     |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                      |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes      | P                                                                                                                         | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1k                                                                                                                    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Syndrome de la mort subite           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                               |                                                                                                                           |



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



PS0225

X  
R  
N

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

NOUVEAU!

2575 UTM

Maintient constamment la hauteur des plants et la tenue de tige sur divers types de parcelles, surtout en conditions de sécheresse. Idéal pour les sols argileux et les rangs espacés, il offre des rendements élevés en rangs moyens à larges. Sa tolérance au stress le rend fiable dans des conditions difficiles.

- Bonne tolérance au sclérotinia et tenue de tige au-dessus de la moyenne pour résister aux conditions exigeantes



Excellente levée en semis direct ou sur sols argileux

Rendements constants grâce à une bonne tolérance à la sécheresse et une large adaptation aux types de sols

| CARACTÉRISTIQUES   |           | GESTION                      |                     |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| Levée              | ●●●●●●●●  | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●            |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●  | Sol marginal                 | ●●●●●●●●            |
| Graines par kg     | 5200-5400 | Sol productif                | ●●●●●●●●            |
| Groupe de maturité | 0,3       | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●            |
|                    |           | Tolérance aux herbicides     | Dicamba, Glyphosate |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |           |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | Pl.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | —         | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●● |



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | ●●●●●●●● |

PS0326

E  
N

Enlist E3  
SOYA

NOUVEAU!

2625 UTM

Option Enlist intéressante. Variété largement adaptée à différents types de sols et environnements de rendement, offrant un ensemble agronomique solide avec une protection intégrée contre le nématode à kyste du soya (NKS). Son excellente vigueur en début de saison et sa bonne adaptation au semis direct favorisent un établissement rapide, tandis que sa très bonne tenue performe bien dans les sols fertiles.

- Excellente vigueur en début de saison et bonne adaptation au semis direct



Très bonne tenue dans les sols fertiles

Stature équilibrée convient à diverses largeurs de rangs et niveaux de productivité des sols.

| CARACTÉRISTIQUES   |          | GESTION                      |                                 |
|--------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| Levée              | ●●●●●●●● | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●                        |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●● | Sol marginal                 | ●●●●●●●●                        |
| Graines par kg     | —        | Sol productif                | ●●●●●●●●                        |
| Groupe de maturité | 0,3      | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●                        |
|                    |          | Tolérance aux herbicides     | Glyphosate, Enlist, Glufosinate |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |               |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | Pl.88 788     | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1c, Rps3a | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●● |



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | ●●●●●●●● |

PS0521

X  
R  
N

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

NOUVEAU!

2675 UTM

Plante haute branchue avec excellente levée et vigueur précoce agressive, idéale pour les sols lourds. Bonne adaptabilité à divers types de sols. Allie fort potentiel offensif de rendement et solide profil défensif, incluant une excellente tolérance au sclérotinia. Sa vigueur et sa tolérance au stress en font un choix fiable avec un fort potentiel de rendement sur un large éventail de régions.

- Ensemble (atout offensif qui va de pair avec atout défensif)



Très bonne tolérance à la pourriture sclérotique

Offre un énorme potentiel de rendement sur une vaste zone géographique

| CARACTÉRISTIQUES   |           | GESTION                      |           |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Levée              | ●●●●●●●●  | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●  |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●  | Sol marginal                 | ●●●●●●●●  |
| Graines par kg     | 4800-5800 | Sol productif                | ●●●●●●●●  |
| Groupe de maturité | 0,5       | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●  |
|                    |           | Tolérance aux herbicides     | RR, Xtend |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |           |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | Pl.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1c    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●● |



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | ●●●●●●●● |

PS0779

X  
R  
N

ROUNDUP READY 2  
XTEND  
SOYA

NOUVEAU!

2750 UTM

Une réponse inégalée en gestion intensive, mais suffisamment résistant même pour les environnements à faible rendement. Positionnez cette variété en toute confiance sur une large plage d'environnements, potentiel d'atteindre de gros rendements en sols hautement productifs. Bonne option pour semis hâtifs, surtout en semis direct.

- Variété exceptionnelle, excellente vigueur en début de saison



Choix des producteurs élités, éprouvé depuis de nombreuses saisons

Très bonnes caractéristiques agronomiques, avec forte tolérance à la moisissure blanche

| CARACTÉRISTIQUES   |           | GESTION                      |           |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Levée              | ●●●●●●●●  | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●  |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●  | Sol marginal                 | ●●●●●●●●  |
| Graines par kg     | 5500-6800 | Sol productif                | ●●●●●●●●  |
| Groupe de maturité | 0,7       | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●  |
|                    |           | Tolérance aux herbicides     | RR, Xtend |

TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |           |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | Pl.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1c    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●● |



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | ●●●●●●●● |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | ●●●●●●●● |



# PS0890

E N



 NOUVEAU!

2750 UTM

Option Enlist à haut rendement. Variété de soya bien adaptée, offrant un fort potentiel de rendement dans les environnements à rendement moyen à élevé. Sa stature moyenne et sa forte capacité à brancher latéralement performent bien dans les rangs plus larges, tandis que sa tolérance à la pourriture brune de la tige et ses solides gènes Phytophthora favorisent une bonne santé de plante.

- ☒ Bonne adaptation aux environnements à rendement moyen à élevé
- ☒ Excellente adaptation aux sols de texture moyenne à fine
- ☒ Bien adaptée aux rangs plus larges


## CARACTÉRISTIQUES

## GESTION


|                    |                                                                                                                           |                              |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol mal drainé               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tenue au champ     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Graines par kg     | 4800 – 5000                                                                                                               | Sol productif                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Groupe de maturité | 0,8                                                                                                                       | Adaptabilité au semis direct | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                    |                                                                                                                           | Tolérance aux herbicides     | Glyphosate, Enlist, Glufosinate                                                                                           |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | PI.88 788                                                                                                                 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1k 3a                                                                                                                 | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                               |                                                                                                                           |



## NOTES



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# PS0944

X R N



2775 UTM

Leader en termes de rendement à travers les maturités dans l'industrie. Flexibilité sur tous les types de sols. Maintient sa hauteur même dans les champs plus exigeants. Très bonne tolérance à la moisissure blanche. Bonne tolérance au champ contre la pourriture phytophthoréenne Rps 1c. Solides caractéristiques défensives générales, y compris la tolérance à la sécheresse.

- ☒ Valeur ajoutée, NKS et pourriture phytophthoréenne Rps 1c, avec forte tolérance au champ
- ☒ Performance incroyable en rendement sur différents types de sols
- ☒ Un type de plant plus grand qui se tient bien pour sa maturité


## CARACTÉRISTIQUES

## GESTION


|                    |                                                                                                                           |                              |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol mal drainé               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tenue au champ     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Graines par kg     | 4200-4400                                                                                                                 | Sol productif                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Groupe de maturité | 0,9                                                                                                                       | Adaptabilité au semis direct | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                    |                                                                                                                           | Tolérance aux herbicides     | RR, Xtend                                                                                                                 |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |           |                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | PI.88 788 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1k    | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                 | F         |                                               |                                                                                                                           |



## NOTES



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# PS1022

E N



2800 UTM

Bonne tolérance à la moisissure blanche. Il convient parfaitement aux terres à haut et bas rendement. Tolérance exceptionnelle au stress, y compris à la brûlure de la feuille par Cercospora. Excellente levée. Performance constante dans tous les environnements. Gérer la population, la fertilité, sous environnements à forte croissance. Variété polyvalente, adaptée à un large éventail de superficie.

- ☒ Variété ENLIST™ convenant de maturité tardive GM 0 à hâtive GM 1
- ☒ NKS et pourriture phytophthoréenne Rps 1c et gène 3a
- ☒ Ensemble (atout offensif qui va de pair avec atout défensif)


## CARACTÉRISTIQUES

## GESTION


|                    |                                                                                                                           |                              |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol mal drainé               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tenue au champ     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Graines par kg     | 4850-6500                                                                                                                 | Sol productif                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Groupe de maturité | 1,0                                                                                                                       | Adaptabilité au semis direct | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                    |                                                                                                                           | Tolérance aux herbicides     | RR, Enlist, LL                                                                                                            |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | PI.88 788                                                                                                                 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1c/3a                                                                                                                 | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                               |                                                                                                                           |



## NOTES



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# PS1224

E N



2825 UTM

La tolérance au SMS et à la moisissure blanche est intrinsèque, de même que la protection contre NKS, afin d'offrir un ensemble complet de mesures défensives.

- ☒ Très forte tolérance au stress
- ☒ Plant buissonnant qui s'adaptera bien aux espacements larges
- ☒ Excellente levée et vigueur hâtive


## CARACTÉRISTIQUES

## GESTION


|                    |                                                                                                                           |                              |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levée              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol mal drainé               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Tenue au champ     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Sol marginal                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Graines par kg     | 4800-5800                                                                                                                 | Sol productif                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Groupe de maturité | 1,2                                                                                                                       | Adaptabilité au semis direct | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                    |                                                                                                                           | Tolérance aux herbicides     | RR, Enlist, LL                                                                                                            |

## TOLÉRANCE À LA MALADIE

|                                                                 |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au nématode à kystes                                 | PI.88 788                                                                                                                 | Tolérance au phytophthora                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Résistance à la race de Phytophthora Syndrome de la mort subite | Rps 1c/3a                                                                                                                 | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                               |                                                                                                                           |



## NOTES



|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du rang 7 po (18 cm)  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 15 po (38 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Largeur du rang 30 po (76 cm) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



PS1344

X  
F  
N



2850 UTM

Très bonne tolérance au sclérotinia et au stress, idéale pour les conditions difficiles. Optimisé pour les faibles populations sur sols fertiles afin de maximiser le rendement sans nuire à la santé des plants. Vigoureux, avec une bonne hauteur, densité de couvert et constance en rangs moyens à larges. Offre un solide profil défensif et de bonnes performances agronomiques en environnements variés.

- ✔

Capacités de rendement élevées, bien adaptées à la production avec rangs allant de largeurs moyennes à larges

✔

Plant plutôt grand qui couvrira quand même bien l'entre-rang

✔

Optimisé pour des populations flexibles afin de maximiser le rendement tout en maintenant la santé des plants

CARACTÉRISTIQUES

GESTION

Levée

Tenue au champ

Graines par kg

Groupe de maturité

Sol mal drainé

Sol marginal

Sol productif

Adaptabilité au semis direct

Tolérance aux herbicides

RR, Xtend, LL

Résistance au nématode à kystes

Résistance à la race de Phytophthora


Syndrome de la mort subite

Pl.88 788

Rps 3a

Tolérance au phytophthora


Tolérance à la pourriture sclérotique du soya



Hauteur du plant: MG

Couleur de la fleur: Violet

Type de plant: M



Pubescence: FP

Couleur du hile: B

Couleur de la gousse: F

Largeur du rang 7 po (18 cm)

Largeur du rang 15 po (38 cm)

Largeur du rang 30 po (76 cm)

PS1777

E  
N



2975 UTM

Offre un excellent potentiel de rendement sous pression de maladie, avec une forte tolérance à la mort subite (SDS) et à la pourriture brune de la tige (BSR). En fin de saison, elle présente une belle répartition des gousses, contribuant à des rendements stables et de qualité. Sa robustesse agronomique et sa tolérance aux maladies en font un choix fiable pour les producteurs visant une productivité élevée tout en maintenant la santé des cultures.

✔

Bonne tolérance au sclérotinia, bonne protection contre le phytophthora et performance constante

✔

Choix fiable pour les producteurs visant une productivité élevée

✔

Bon ensemble agronomique pour faire face aux maladies

CARACTÉRISTIQUES

GESTION

Levée

Tenue au champ

Graines par kg

Groupe de maturité

Sol mal drainé

Sol marginal

Sol productif

Adaptabilité au semis direct

Tolérance aux herbicides

Enlist, Glyphosate, Glufosinate

Résistance au nématode à kystes

Résistance à la race de Phytophthora


Syndrome de la mort subite

Pl.88 788

Rps 1k

Tolérance au phytophthora


Tolérance à la pourriture sclérotique du soya



Hauteur du plant: M

Couleur de la fleur: Violet

Type de plant: MB



Pubescence: LT

Couleur du hile: BL

Couleur de la gousse: T

Largeur du rang 7 po (18 cm)

Largeur du rang 15 po (38 cm)

Largeur du rang 30 po (76 cm)

PS1923

X  
F  
N



3000 UTM

Excellente levée et vigueur précoce, idéale pour les terres argileuses et la gestion en semis direct. Affiche une performance optimale en rangs de 20 po ou moins, maximisant la densité de peuplement et le potentiel de rendement. Dotée des gènes Rps 1c/3a, cette variété offre une tolérance accrue et durable au pourridié phytophthoréen, assurant une meilleure protection contre les maladies et une tenue améliorée tout au long de la saison.

✔

Très bonnes qualités agronomiques

✔

Plante attrayante de taille moyenne à grande avec une bonne ramification

✔

Un ensemble défensif solide qui permet une large adaptation au terrain

CARACTÉRISTIQUES

GESTION

Levée

Tenue au champ

Graines par kg

Groupe de maturité

Sol mal drainé

Sol marginal

Sol productif

Adaptabilité au semis direct

Tolérance aux herbicides

RR, Xtend, LL

Résistance au nématode à kystes

Résistance à la race de Phytophthora


Syndrome de la mort subite

Pl.88 788

Rps 1c/3a

Tolérance au phytophthora


Tolérance à la pourriture sclérotique du soya



Hauteur du plant: M

Couleur de la fleur: Violet

Type de plant: B



Pubescence: FP

Couleur du hile: N

Couleur de la gousse: BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

Largeur du rang 15 po (38 cm)

Largeur du rang 30 po (76 cm)

PS2120

E  
N



3075 UTM

Forte tolérance à la pourriture sclérotique, résistance à la pourriture brune de la tige et au chancre de la tige. Gène Rps 1k contre la pourriture phytophthoréenne avec une très bonne tolérance au champ. Très adaptée lorsque positionnée dans des environnements à haut rendement ou en semis direct. S'adapte à différents espacements. Conserve sa hauteur et présente une excellente largeur sous stress. Positionnez-la avec confiance et poussez-la pour obtenir des rendements élevés.

✔

De fortes caractéristiques défensives qui se manifestent dans de nombreux environnements différents

✔

Sa performance en rendement la fait se distinguer des normes de contrôle de GM II

✔

Rendement supérieur avec des gousses groupées au sommet et complètes

CARACTÉRISTIQUES

GESTION

Levée

Tenue au champ

Graines par kg

Groupe de maturité

Sol mal drainé

Sol marginal

Sol productif

Adaptabilité au semis direct

Tolérance aux herbicides

RR, Enlist, LL

Résistance au nématode à kystes

Résistance à la race de Phytophthora


Syndrome de la mort subite

Pl.88 788

Rps 1k

Tolérance au phytophthora


Tolérance à la pourriture sclérotique du soya



Hauteur du plant: MG

Couleur de la fleur: Violet

Type de plant: MB



Pubescence: GR

Couleur du hile: NI

Couleur de la gousse: BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

Largeur du rang 15 po (38 cm)

Largeur du rang 30 po (76 cm)

58 • Semences PRIDE 2027 Guide de Semence

AXÉ PERFORMANCE FONDÉ SUR PRIDE • 59



PS2226

XFN

TENDFLEX

SOYA

NOUVEAU!


3150 UTM

Variété de soya offrant une bonne performance dans différents types de sols. Sa stature moyenne, sa bonne tenue et sa solide tolérance aux maladies en font un choix fiable pour les producteurs.

- ☒ Bonne tenue pour une récolte efficace
- ☒ Solide tolérance aux maladies
- ☒ Beau couvert végétal

| CARACTÉRISTIQUES   |            | GESTION                      |                                  |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|
| Levée              | ●●●●●●●●●● | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●●●                       |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●●● | Sol marginal                 | ●●●●●●●●●●                       |
| Graines par kg     | –          | Sol productif                | ●●●●●●●●●●                       |
| Groupe de maturité | 2,2        | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●●●                       |
|                    |            | Tolérance aux herbicides     | Glyphosate, Dicamba, Glufosinate |

|                                      |            |                                               |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pl.88 788  | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1k     | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●●●● |
| Syndrome de la mort subite           | ●●●●●●●●●● |                                               |            |



Hauteur du plant:


M

Couleur de la fleur:

Violet

Type de plant:

MB



Pubescence:

LT

Couleur du hile:

BL

Couleur de la gousse:

BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 15 po (38 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 30 po (76 cm)

●●●●●●●●●●

NOTES

PS2322

XFN

TENDFLEX

SOYA


3150 UTM

Se déplace bien dans de nombreux types de sols, mais excelle dans les sols plus légers. Conserve une excellente hauteur du plant dans les sols argileux. Un type de plant plus grand pour une fermeture plus hâtive du couvert végétal. Très forte levée qui excelle dans les sols lourds et sous les pratiques de semis direct. Tirera profit des environnements à rendements élevés.

- ☒ Plant moyennement grand avec une très bonne tenue au champ
- ☒ Positionner avec confiance pour apporter un potentiel de rendement haut de gamme
- ☒ Très bonne tenue au champ et bel aspect à la récolte

| CARACTÉRISTIQUES   |            | GESTION                      |               |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Levée              | ●●●●●●●●●● | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●●●    |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●●● | Sol marginal                 | ●●●●●●●●●●    |
| Graines par kg     | 5000-5600  | Sol productif                | ●●●●●●●●●●    |
| Groupe de maturité | 2,3        | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●●●    |
|                    |            | Tolérance aux herbicides     | RR, Xtend, LL |

|                                      |            |                                               |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pl.88 788  | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1c     | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●●●● |
| Syndrome de la mort subite           | ●●●●●●●●●● |                                               |            |



Hauteur du plant:


MG

Couleur de la fleur:

Violet

Type de plant:

MB



Pubescence:

GR

Couleur du hile:

NI

Couleur de la gousse:

BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 15 po (38 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 30 po (76 cm)

●●●●●●●●●●

NOTES

PS2325

EN

Enlist E3

SOYA

NOUVEAU!


3175 UTM

Polyvalent selon le type de sol, avec une excellente tolérance au stress et un fort potentiel de rendement. Conserve sa hauteur et sa tenue dans divers environnements, y compris en conditions difficiles. Idéal pour les producteurs recherchant un rendement fiable, avec une bonne réponse aux pratiques de gestion et de densité élevées. Offre des rendements constants, même en saisons difficiles.

- ☒ Hauteur de plante et tenue constantes à travers différents types de parcelles
- ☒ Tolérance exceptionnelle au stress: performant malgré la sécheresse, la chaleur ou d'autres conditions difficiles
- ☒ Régularité du rendement selon les environnements, avec un bon potentiel de réponse à une gestion et une densité plus intensives

| CARACTÉRISTIQUES   |            | GESTION                      |                                 |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|
| Levée              | ●●●●●●●●●● | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●●●                      |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●●● | Sol marginal                 | ●●●●●●●●●●                      |
| Graines par kg     | 5300-6200  | Sol productif                | ●●●●●●●●●●                      |
| Groupe de maturité | 2,4        | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●●●                      |
|                    |            | Tolérance aux herbicides     | Enlist, Glyphosate, Glufosinate |

|                                      |            |                                               |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pl.88 788  | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1k     | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●●●● |
| Syndrome de la mort subite           | ●●●●●●●●●● |                                               |            |



Hauteur du plant:


MG

Couleur de la fleur:

Violet

Type de plant:

MB



Pubescence:

LT

Couleur du hile:

N

Couleur de la gousse:

BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 15 po (38 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 30 po (76 cm)

●●●●●●●●●●

NOTES

PS2923

EN

Enlist E3

SOYA


3250 UTM

Valeur ajoutée, offre une protection contre le NKS Pékin et la pourriture phytophthoréenne des racines Rps 1k. Remarquable levée au printemps. Un ensemble de mesures défensives solides comprenant une très bonne résistance à la moisissure blanche. Candidat idéal pour les sols argileux et les pratiques de semis direct. Très bonne résistance au syndrome de la mort subite.

- ☒ Largement adapté à tous les types de sols et de gestion
- ☒ Un type de plant plus grand pour une fermeture plus hâtive du couvert végétal
- ☒ Offre un excellent potentiel de performance et de qualités agronomiques aux régions du GM II

| CARACTÉRISTIQUES   |            | GESTION                      |                |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Levée              | ●●●●●●●●●● | Sol mal drainé               | ●●●●●●●●●●     |
| Tenue au champ     | ●●●●●●●●●● | Sol marginal                 | ●●●●●●●●●●     |
| Graines par kg     | 5100-5200  | Sol productif                | ●●●●●●●●●●     |
| Groupe de maturité | 2,9        | Adaptabilité au semis direct | ●●●●●●●●●●     |
|                    |            | Tolérance aux herbicides     | RR, Enlist, LL |

|                                      |            |                                               |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Résistance au nématode à kystes      | Pékin      | Tolérance au phytophthora                     | ●●●●●●●●●● |
| Résistance à la race de Phytophthora | Rps 1k     | Tolérance à la pourriture sclérotique du soya | ●●●●●●●●●● |
| Syndrome de la mort subite           | ●●●●●●●●●● |                                               |            |



Hauteur du plant:


MG

Couleur de la fleur:

Violet

Type de plant:

MB



Pubescence:

F

Couleur du hile:

BR

Couleur de la gousse:

BR

Largeur du rang 7 po (18 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 15 po (38 cm)

●●●●●●●●●●

Largeur du rang 30 po (76 cm)

●●●●●●●●●●

NOTES


60 • Semences PRIDE 2027 Guide de Semence

AXÉ PERFORMANCE FONDÉ SUR PRIDE • 61



## This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Semences PRIDE s'engage à vous accompagner à chaque étape de la saison grâce à des ressources agronomiques à jour et une expertise personnalisée pour vous aider à réussir.



## Date: \_\_\_\_\_

|                  |                         |           |              |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Nom de la ferme: | Zone de Semences PRIDE: |           |              |
| Adresse:         | Ville:                  | Province: | Code postal: |
| Nom du contact:  | Numéro de téléphone:    |           |              |
| Courriel:        |                         |           |              |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Acres totales en maïs:               | Acres totales en soya:    |
| Maturité du maïs (UTM):              | Maturité du soya (UTM):   |
| Nom du détaillant:                   | Représentant:             |
| Numéro de téléphone du représentant: | Courriel du représentant: |

## MAÏS

[illegible][illegible]**SEMENCES PRIDE**

6836 Pain Court Line  
Pain Court (Ontario) NOP 1Z0  
Canada

C.P. 1088  
Chatham (Ontario) N7M 5L6  
Canada

Les commandes peuvent être effectuées auprès de votre agent local Semences PRIDE. Pour trouver l'agent le plus proche, veuillez scanner le code QR.



Profitez des options de paiement  
et des programmes offerts par  
Semences PRIDE, incluant notamment:

- Escomptes pour paiement anticipé
- Modalités de paiement flexibles
- Programmes Plan Partenaire\*

\*Consultez votre Guide du Programme Producteur pour plus de détails ou contactez-nous au **1-800-265-5280**.



# Rencontrez notre équipe des ventes

Les agriculteurs et les agents ont accès à des produits de premier plan et au soutien de confiance de l'équipe Semences PRIDE.

Derrière chaque produit Semences PRIDE se trouve une équipe engagée à aider les agriculteurs à réussir. Nos équipes des ventes, d'agronomie et du service à la clientèle apportent une expertise locale, une expérience pratique et un soutien personnalisé à chaque acre. Présents dans les mêmes régions que nos clients, nous comprenons les réalités, les défis et les occasions propres à votre ferme.

De la planification à la récolte, nous sommes fiers de travailler à vos côtés en offrant une expertise au bon moment. Que vous ayez besoin de conseils agronomiques, de recommandations de produits ou d'un soutien en cours de saison, votre équipe locale Semences PRIDE est prête à vous aider.



**Doug Alderman**

Vice-président, Commercial

519-383-9536

[dalderman@prideseeds.com](mailto:dalderman@prideseeds.com)



**Jeremy O'Shea**

Gestionnaire des ventes en Ontario

519-868-7300

[joshea@prideseeds.com](mailto:joshea@prideseeds.com)



**Matthew Chapple**

Gestionnaire développement produits et agronomie

519-359-3856

[mchapple@prideseeds.com](mailto:mchapple@prideseeds.com)



**Chantal Lowes**

Spécialiste de soutien aux ventes

1-800-265-5280 [ext. 237]

[clowes@prideseeds.com](mailto:clowes@prideseeds.com)



**Kyle Martin**

Spécialiste de soutien aux ventes

1-800-265-5280 [ext. 245]

[kmartin@prideseeds.com](mailto:kmartin@prideseeds.com)



**Taylor Lachance**

Spécialiste de soutien aux ventes (Bilingue)

1-800-265-5280

[tlachance@prideseeds.com](mailto:tlachance@prideseeds.com)



**Graham Smyth**

Directeur régional des ventes Sud-ouest de l'Ontario

226-542-5564

[gsmyth@prideseeds.com](mailto:gsmyth@prideseeds.com)



**Stephanie Myslik**

Agronome, Dév. de marché Sud-ouest de l'Ontario

519-359-7221

[smyslik@prideseeds.com](mailto:smyslik@prideseeds.com)



**Matthew Fletcher**

Directeur régional des ventes Sud-est de l'Ontario

519-717-0368

[mfletcher@prideseeds.com](mailto:mfletcher@prideseeds.com)



**Carrie MacLean**

Agronome, Dév. de marché Sud-est de l'Ontario

519-282-3253

[cmaclea@prideseeds.com](mailto:cmaclea@prideseeds.com)



**Taylor Brophy**

Directrice régionale des ventes Est de l'Ontario

343-551-5353

[tbrophy@prideseeds.com](mailto:tbrophy@prideseeds.com)



**Justin McNally**

Agronome, Dév. de marché Est de l'Ontario

226-332-0539

[jmcnally@prideseeds.com](mailto:jmcnally@prideseeds.com)



**Matt Ross**

Directeur régional des ventes Centre-ouest de l'Ontario

226-332-1956

[mross@prideseeds.com](mailto:mross@prideseeds.com)



**Brendan Zettler**

Agronome, Dév. de marché Centre-ouest de l'Ontario

226-230-4102

[bzettler@prideseeds.com](mailto:bzettler@prideseeds.com)



**Olivia Noorenberghe**

Responsable de l'agronomie Ontario

226-821-1905

[onoorenberghe@prideseeds.com](mailto:onoorenberghe@prideseeds.com)



**Mathieu Goulet**

Directeur régional des ventes Rive-Sud du Québec

438-449-8609

[mgoulet@semencespride.com](mailto:mgoulet@semencespride.com)



**Stéphane Pépin**

Directeur régional des ventes Rive-Nord du Québec

514-605-4662

[spedin@semencespride.com](mailto:spedin@semencespride.com)



**Francis Allard**

Agronome, Dév. de marché Québec

418-953-1076

[fallard@semencepride.com](mailto:fallard@semencepride.com)



**Sara Nielsen**

Directrice régionale des ventes Ouest canadien

519-917-2225

[snielsen@prideseeds.com](mailto:snielsen@prideseeds.com)



**Breanne Rey**

Agronome, Dév. de marché Manitoba et est de la Sask.

204-903-5373

[brey@prideseeds.com](mailto:brey@prideseeds.com)



**Aidan Filipchuk**

Agronome, Dév. de marché Alberta et ouest de la Sask.

403-586-4601

[afilipchuk@prideseeds.com](mailto:afilipchuk@prideseeds.com)



**Roberto Racho**

Associé ventes et agronomie Ouest canadien

236-882-0302

[rracho@prideseeds.com](mailto:rracho@prideseeds.com)



Toutes les commandes et toutes les ventes sont sujettes aux « Conditions générales de vente » de Semences PRIDE. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, la « Limite de garantie », les « Zones agronomiques » et « l'Année de semis ». Les Conditions générales de vente peuvent être modifiées de temps à autre, sans préavis. Pour consulter la version la plus récente, rendez-vous sur : [prideseeds.com/terms-of-sale](https://prideseeds.com/terms-of-sale)

Bayer est membre du programme Excellence Through Stewardship® (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux directives de lancement responsable du programme ETS, ainsi qu'à la politique de Bayer concernant la commercialisation des produits de biotechnologie agricole. Toute culture ou tout matériau issu de ces produits ne peut être exporté, utilisé ou vendu que dans les pays où les approbations réglementaires ont été obtenues. L'exportation de matériel génétique non approuvé dans certaines juridictions constitue une violation des lois nationales et internationales. Les producteurs doivent consulter leur acheteur ou leur négociant en grains pour s'assurer de leur politique d'achat. Excellence Through Stewardship® est une marque déposée.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DU PESTICIDE. Il est illégal, selon la loi fédérale, d'utiliser un pesticide autrement que conformément à son étiquette. Les formulations de dicamba ou de glyphosate ne sont PAS TOUTES approuvées pour une application en culture avec les soyas Roundup Ready 2 Xtend. De même, toutes les formulations de dicamba, de glyphosate ou de glufosinate ne sont PAS approuvées pour une application en culture avec les produits dotés de la technologie XtendFlex. UTILISEZ UNIQUEMENT DES FORMULATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉTIQUETÉES ET APPROUVÉES À CET EFFET. Pour toute question concernant le statut d'homologation des herbicides à base de dicamba pour une utilisation sur les cultures avec les technologies Roundup Ready 2 Xtend ou XtendFlex, veuillez communiquer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

La technologie Roundup Ready 2 contient des gènes conférant une tolérance au glyphosate. Les produits dotés de la technologie XtendFlex contiennent des gènes conférant une tolérance au glyphosate, au glufosinate et au dicamba. Les soyas Roundup Ready 2 Xtend contiennent des gènes conférant une tolérance au glyphosate et au dicamba. Le glyphosate, le dicamba et le glufosinate tuent les cultures qui ne leur sont pas tolérantes. Veuillez consulter votre détaillant Bayer, le Guide d'utilisation de la technologie de Bayer ou communiquer avec le service technique au 1-888-283-6847 pour obtenir les programmes recommandés de lutte contre les mauvaises herbes du système de culture Roundup Ready Xtend.

©2026 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

Les semences dotées du caractère LibertyLink® (LL) sont résistantes au glufosinate d'ammonium, une solution de rechange au glyphosate dans le maïs. Elles allient un fort potentiel génétique à un puissant désherbage non sélectif en postlevée grâce aux herbicides Liberty®, assurant un rendement optimal et une excellente suppression des mauvaises herbes. Consultez les étiquettes des sacs pour connaître les options d'herbicide des produits E-Z Refuge. Seuls les produits étiquetés EZ1 peuvent être pulvérisés avec des herbicides à base de glufosinate d'ammonium, y compris l'herbicide Liberty. LibertyLink®, Liberty Liberty® et le logo de la goutte d'eau sont des marques déposées de BASF. Utilisées sous licence.

La technologie des caractères du maïs contenue dans ces semences est commercialisée sous licence de Syngenta Seeds, LLC. La technologie Herculex® contenue dans ces semences est commercialisée sous licence de Corteva Agriscience LLC.

DÉCLARATION D'UTILISATION DU PRODUIT: Les soyas Enlist E3 contiennent le caractère Enlist E3, qui permet des applications en survol étiquetées d'herbicides à base de glyphosate, glufosinate et 2,4-D utilisant la technologie Colex-D, lorsqu'ils sont appliqués conformément aux directives de l'étiquette. Après le traitement de brûlage, les seuls herbicides contenant du 2,4-D pouvant être utilisés avec les cultures Enlist™ sont ceux qui comportent la technologie Colex-D et sont expressément étiquetés pour une telle utilisation. Les produits à base de 2,4-D ne contenant pas la technologie Colex-D ne sont pas autorisés pour utilisation avec les soyas Enlist E3.

AVERTISSEMENT: Les soyas Enlist E3 tolèrent les applications en survol de glyphosate, glufosinate et 2,4-D. L'application accidentelle d'un herbicide non compatible sur cette variété peut entraîner une perte totale de la culture. Lorsqu'il utilise des herbicides à base de 2,4-D, le producteur accepte de n'utiliser que des produits contenant la technologie Colex-D autorisée pour les soyas Enlist E3.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE AVANT D'APPLIQUER TOUT HERBICIDE. Enlist™ 1 et Enlist Duo™ sont les seuls produits à base de 2,4-D autorisés pour les cultures Enlist. Consultez les étiquettes des herbicides Enlist pour connaître les espèces de mauvaises herbes ciblées. D'autres exigences de gestion spécifiques aux produits Enlist, y compris le Guide d'utilisation des produits Enlist™, sont disponibles à l'adresse suivante: [www.EnlistCanada.ca](http://www.EnlistCanada.ca). Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette. L'événement transgénique contenu dans le soya Enlist E3 a été conjointement développé et appartient à Corteva Agriscience et à M.S. Technologies, L.L.C. Duracade, Vibrance, Maxim, Draco™, Rooting Power, Viptera, Artesian sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta. Des renseignements supplémentaires sur Duracade sont disponibles sur le site [biotradeshatus.com](https://biotradeshatus.com).

Important: Toujours lire et suivre les directives figurant sur l'étiquette. Certains produits peuvent ne pas être homologués pour la vente ou l'utilisation dans toutes les provinces ou régions. Veuillez vérifier auprès de votre service local de vulgarisation pour confirmer l'état de l'homologation.

AVANT DE SEMER, VOUS DEVEZ SIGNER UNE CONVENTION D'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE ET LIRE LE GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT. L'ACQUISITION DE CES SEMENCES EST ASSUJETIE À UNE CONVENTION QUI COMPREND LES MODALITÉS SUIVANTES: Une licence doit d'abord être obtenue auprès de Corteva Agriscience en signant une Convention d'Utilisation de la Technologie (CUT). L'utilisateur doit respecter les conditions des Guides d'utilisation des produits pour toutes les technologies contenues dans ces semences, incluant la Gestion de la résistance aux herbicides (GRH) et les exigences d'utilisation qui y sont détaillées. Ces documents sont disponibles à l'adresse suivante: [corteva.ca/fr/trait-stewardship](https://corteva.ca/fr/trait-stewardship).

Corteva Agriscience est membre du programme Excellence Through Stewardship® (ETS). Les produits de Corteva Agriscience sont commercialisés conformément aux directives du programme ETS en matière de gestion des lancements de produits, ainsi qu'à la politique de Corteva en matière de gestion responsable des produits.

Aucune culture ou matière dérivée de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue dans des pays où l'importation de tels produits n'est pas autorisée. Les producteurs doivent consulter leur acheteur ou leur négociant en grains afin de confirmer leur position d'achat pour ce produit.

Pour obtenir plus de renseignements sur les options de commercialisation de vos cultures ou grains, veuillez contacter Corteva Agriscience au 1-800-667-3852. Des renseignements sur l'état réglementaire et commercial des produits de biotechnologie agricole sont disponibles à l'adresse suivante: [biotradeshatus.com](https://biotradeshatus.com).

Ces semences sont couvertes par Corteva Agriscience et M.S. Technologies, L.L.C. Les droits de brevet peuvent être consultés à l'adresse suivante: [www.corteva.ca/fr/trait-stewardship.html](https://www.corteva.ca/fr/trait-stewardship.html). L'achat de ces semences ne confère aucune autorisation de leur utilisation au titre desdits brevets.

INFORMATION SUR LES BREVETS: L'événement transgénique du soya Enlist E3™ est protégé par des droits de brevet détenus par Corteva Agriscience et M.S. Technologies, L.L.C. Ces droits peuvent être consultés à l'adresse suivante: [corteva.ca/fr/trait-stewardship](https://corteva.ca/fr/trait-stewardship). L'achat de ces semences n'accorde aucune autorisation d'utilisation en vertu de ces brevets.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre détaillant autorisé ou Corteva Agriscience au 1-800-667-3852 ou visitez [corteva.ca/fr/trait-stewardship](https://corteva.ca/fr/trait-stewardship).

Important: Toujours lire et suivre les directives figurant sur l'étiquette du sac et sur l'étiquette du produit. Seules les semences étiquetées comme tolérantes au glufosinate peuvent être pulvérisées avec des herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

Selon la disponibilité dans toutes les plages de maturité, Semences PRIDE offre des options de semences traitées avec insecticide et fongicide, fongicide seulement ou non traitées. Veuillez consulter votre détaillant local ou votre représentant Semences PRIDE pour plus d'information, ou encore vous informer sur la réglementation provinciale applicable aux traitements de semences.

PRIDE®, le logo PRIDE Seeds®, et AgriShield™ sont des marques déposées de AgReliant Genetics Inc. et de ses sociétés affiliées. La technologie de lutte contre les insectes fournie par Vip3A est utilisée sous licence de Syngenta Crop Protection AG. Acceleron®, RIB Complete®, Roundup Ready 2 Technology and Design®, Roundup Ready 2 Xtend®, Roundup Ready 2 Yield®, Roundup Ready®, Roundup®, SmartStax®, SmartStax® PRO, Trecepta®, VT Double PRO®, VT4PRO® et XtendFlex® sont des marques déposées du groupe Bayer, utilisées sous licence. Liberty®, LibertyLink® et le logo LibertyLink® sont des marques déposées de BASF, utilisées sous licence. Agrisure Viptera est une marque déposée d'une entreprise du groupe Syngenta, utilisée sous licence. Agrisure Viptera®, E-Z Refuge®, Agrisure Duracade®, Fortenza®, Vayantis®, Vibrance® Cinco, and Draco™ sont des marques de commerce du groupe Syngenta, utilisées sous licence. LibertyLink®, Liberty® et le design de la goutte d'eau sont des marques déposées de BASF, utilisées sous licence. Herculex® est une marque déposée de Corteva Agriscience, utilisée sous licence. L'événement transgénique du soya Enlist E3™ a été conjointement développé et appartient à Corteva Agriscience et M.S. Technologies, L.L.C. Enlist, Enlist E3, le logo Enlist E3, Enlist Duo et Colex-D sont des marques de commerce de Corteva Agriscience, utilisées sous licence. Excellence Through Stewardship® est une marque déposée de l'organisation Excellence Through Stewardship®. Respect the Refuge, Corn Design et Respect the Refuge sont des marques déposées de la National Corn Growers Association.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. ©2026 GDM Seeds, Inc.





Gestion de la Résistance des Insectes  
Semer des refuges. Préserver la technologie.

Avant d'ouvrir un sac de semence, vous devez lire, comprendre et accepter les pratiques d'utilisation responsable, incluant les règles applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes, des caractères biotechnologiques exprimés dans la semence, tel que stipulé dans l'Entente de gestion responsable des technologies de Bayer que vous signez. En ouvrant le sac et en utilisant la semence qu'il contient, vous acceptez de vous conformer aux principes d'utilisation responsable en vigueur.



# Enracinés dans le partenariat. Saison après saison.

## Merci de faire partie de notre histoire.

Que vous soyez client Semences PRIDE depuis plusieurs années ou que vous semiez nos produits pour la première fois, nous sommes fiers de faire partie de votre ferme. La confiance et les partenariats que nous avons développés ensemble sont au cœur de ce qui nous définit.

Restez connecté pour découvrir les plus récentes ressources agronomiques, les nouveautés de la gamme et l'information sur les événements dans votre région.



SemencesPRIDE



@prideseeds



@SemencesPRIDE



PRIDE Seeds



[prideseeds.com/fr](https://prideseeds.com/fr)



# Fondé sur PRIDE

**Derrière chaque ferme se trouve une histoire qui mérite d'être célébrée, et nous sommes fiers d'en faire partie.**

**Il existe une fierté bien particulière qui vient d'une journée de travail bien accomplie.** Cette fierté se retrouve dans le soin, l'engagement et la détermination qui façonnent chaque décision et chaque acre.

Depuis plus de 75 ans, **Semences PRIDE** accompagne les agriculteurs canadiens en soutenant les personnes et la passion qui sont à l'origine de fermes solides, de partenariats durables et d'un **avenir à transmettre aux prochaines générations.**

Alors que la prochaine génération de l'agriculture prend racine, ces histoires se poursuivent.

Nous serons là pour en écrire la suite, **en créant des moments de fierté, saison après saison.**



MD

SEMENCES PRIDE



Pour en savoir plus, scannez le code QR ou communiquez avec nous au 1-800-265-5280.

